Ractosuin® 10%

Aditivo melhorador de desempenho.

Composição Básica do Produto:
Ácido Benzoico, BHT (Butilhidroxitolueno), Cloridrato de Ractopamina, Óleo de Soja Refinado, Casca de Arroz.

Eventuais Substitutivos:
Não há Substitutivos.

Níveis de Garantia do Produto:

Garantias	Valor	Unidade
Ractopamina*	89,21	g/kg

*equivalente a 100,0000 g/kg de Cloridrato de Ractopamina

Indicação de Uso:
É indicado para uso exclusivo em suínos em fase de terminação, para a melhora da conversão alimentar, proporcionando maior ganho de peso com menor consumo de ração.

Modo de Usar:
O produto deverá ser misturado à ração dos suínos em terminação na proporção de 100 a 200 gramas do **Ractosuin 10%** por tonelada de ração, pelo período de 28 dias pré-abate. Para garantir uma distribuição homogênea do **Ractosuin 10%** na ração final, é recomendável fazer-se uma pré-mistura com milho moído ou farelo de soja e posteriormente misturar na ração. É recomendável também que não se misture o produto ao mesmo tempo com o óleo vegetal quando este for adicionado à ração. A ração deverá ser a única fonte de alimento dos suínos para esta fase de criação.

Período de Retirada:
O produto não requer período de carência anteriormente ao abate dos animais.

Restrições:
Este produto não deve ser utilizado nas fases de cria e recria.

Modo de Conservar:
Conservar o produto em sua embalagem original em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Reações adversas nos animais:
A ractopamina é pouco tóxica e o produto, quando usado nas dosagens indicadas, não provoca reações adversas. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem ocorrer. Nestes casos, indica-se tratamento sintomático.

Medidas de Precaução:
Mantenha o produto fora do alcance de crianças. Ao manusear o produto, utilizar os equipamentos de proteção individual (roupa protetora, luvas impermeáveis, óculos protetores para os olhos e máscara contra pó). Após manipulação do produto, os operadores devem se lavar

completamente com água e sabão. Em caso de contato acidental com os olhos ou com a pele, lavar imediatamente com água em abundância. No caso de inalação ou ingestão procurar auxílio médico.

Atenção: **Ractosuin 10%** não se destina para uso em seres humanos. O Cloridrato de Ractopamina, ingrediente ativo do **Ractosuin 10%**, é um agonista beta-adrenérgico, portanto, pessoas com doenças cardiovasculares devem tomar precauções especiais para evitar exposição ao produto.

VENDA PROIBIDA EM CASAS COMERCIAIS E ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Produto Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP 000005-1.000038

Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira

PAPEL

Leia o **QR code** e acesse nosso **Áudio Bula.**

Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)

ourofino saúde animal

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
BRASIL
ESTABELECIMENTO REGISTRADO
SP 000005-1
ALIMENTAÇÃO ANIMAL