

Ractosuin®

Aditivo melhorador de desempenho.

Composição Básica do Produto:

Ácido Benzoico, BHT
(Butilhidroxitolueno), Cloridrato de
Ractopamina, Óleo de Soja
Refinado, Casca de Arroz.

Eventuais Substitutivos:

Não há Substitutivos

Níveis de Garantia do Produto:

Garantias Valor Unidade
Ractopamina* ... 18,29g/kg
*equivalente a 20,50 g/kg de
cloridrato de ractopamina

Indicação de uso:

É indicado para uso exclusivo em
suínos em fase de terminação,
para a melhora da conversão
alimentar, proporcionando maior
ganho de peso diário e peso vivo
final, com menor consumo de
ração.

Modo de Usar:

O produto deverá ser misturado à
ração dos suínos em terminação
na proporção de 500 a 1000
gramas do Ractosuin por
tonelada de ração, pelo período
de 28 dias pré-abate. Para
garantir uma distribuição
homogênea do Ractosuin na
ração final, é recomendável
fazer-se uma pré-mistura com
milho moído ou farelo de soja e
posteriormente misturar na ração.

É recomendável também que não
se misture o produto ao mesmo
tempo com o óleo vegetal
quando este for adicionado à
ração. A ração deverá ser a única
fonte de alimento dos suínos para
esta fase de criação.

Período de Retirada:

O produto não requer período de
carência anteriormente ao abate
dos animais.

Restrições:

Este produto não deve ser
utilizado nas fases de cria e recria.

Modo de Conservar:

Conservar o produto em sua
embalagem original em local seco
e fresco, em temperatura entre
15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar
direta, fora do alcance de
crianças e animais domésticos.

Medidas de Precaução:

Mantenha o produto fora do
alcance de crianças. Ao
manusear o produto, utilizar os
equipamentos de proteção
individual (roupa protetora, luvas
impermeáveis, óculos protetores
para os olhos e máscara contra
pó). Após manipulação do
produto, os operadores devem se
lavar completamente com água e
sabão. Em caso de contato
acidental com os olhos ou com a

pele, lavar imediatamente com água em abundância. No caso de inalação ou ingestão procurar auxílio médico.

Atenção: Ractosuin não se destina para uso em seres humanos. O Cloridrato de Ractopamina, ingrediente ativo do **Ractosuin** é um agonista beta-adrenérgico, portanto, pessoas com doenças cardiovasculares devem tomar precauções especiais para evitar exposição ao produto.

Reações adversas nos animais:

A ractopamina é pouco tóxica e o produto, quando usado nas dosagens indicadas, não provoca reações adversas. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem ocorrer. Nestes casos, indica-se tratamento sintomático.

VENDA PROIBIDA EM CASAS COMERCIAIS E ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.50

Produto Registrado no Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento sob o nº SP
000005-1.000043

Fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria Brasileira



Atendimento
16 3518 2025



Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



PAPEL

