Fos 350®

Fórmula:
Cada 100 g contém:
Fosfomicina
base (Cálcica) ..... 25,00 g*
Vitamina C ..... 10,00 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 g
*Equivalente a 35,15 g de Fosfomicina Cálcica

Indicações:
Fos 350 é um antimicrobiano indicado para a espécie *Gallus gallus domesticus* (frangos de corte, matrizes de frangos de corte e poedeiras comerciais) no controle e tratamento de enfermidades causadas por: *Escherichia coli, Pasteurella multocida, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus* e *Streptococcus* sp.

Modo de uso e dosagem:
Fos 350 deve ser administrado pela via oral misturado à água ou à ração, durante 3 a 5 dias consecutivos ou à critério do médico-veterinário.
Dosagem: 40 mg de Fosfomicina base/kg de peso corporal, equivalente a:
Frango de Corte
• 800 g a 2.000 g de **Fos 350**/ tonelada de ração.
• 400 g a 1.000 g de **Fos 350**/ 1.000 litros de água.
Matrizes de Frangos de Corte e Poedeiras Comerciais
• 2.000 g de **Fos 350**/ tonelada de ração.
• 1.000 g de **Fos 350**/ 1.000 litros de água.
A eficácia de antimicrobianos depende da sensibilidade dos microrganismos aos princípios ativos que compõe o produto e do atendimento adequado às recomendações do médico-veterinário que prescreveu o medicamento, como dose, tempo de tratamento e quantidade de aplicações.

Precauções em animais:
Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.
Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações na dosagem do produto.
A ração medicada deverá ser a única fonte de alimento administrada aos frangos de corte, matrizes de frangos de corte e poedeiras comerciais durante o tratamento.
A água medicada deverá ser a única fonte de água administrada aos frangos de corte, matrizes de frangos de corte e poedeiras comerciais durante o tratamento.

Precauções em humanos:
Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequadas. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.
Após a aplicação do produto,

remover as luvas e lavar bem as mãos.
Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não misturar a outros produtos

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não jogar em rios ou lagos.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
Aves (*Gallus gallus domesticus*/FRANGO DE CORTE E POSTURA)
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
OVOS: OS OVOS DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVEM SER DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. ANTES DESTE PERÍODO, OS OVOS DEVEM SER DESCARTADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contraindicações:
Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade à Fosfomicina.

Não utilizar medicamentos com prazo de validade vencido.

Reações Adversas:
Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15ºC e 30ºC, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.493 em 08/06/2009

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira

PAPEL

Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)

ourofino saúde animal