Gentrin® Infusão Uterina

Uso Veterinário

Produto pronto para uso

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Gentamicina base
(como Sulfato) ..... 300,00 mg
Cloridrato de
Bromexina ..... 150,00 mg
Cloreto de
Benzalcônio ..... 100,00 mg
Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

Indicações:

Gentrin Infusão Uterina é indicado no tratamento das metrites e endometrites que acometem os bovinos, equinos e suínos causadas por: *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Corynebacterium pyogenes*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp, *Klebsiella* spp, *Shigella* spp, *Samonella* spp, *Proteus* spp.

Modo de uso e dosagem:

Gentrin Infusão Uterina deve ser administrado diretamente no útero, com o auxílio de uma pipeta de inseminação artificial, obedecendo às dosagens abaixo:

Dosagens:

Bovinos (vacas): 50 a 100 mL por infusão.
Equinos (éguas): 100 a 200 mL por infusão.
Suínos (porcas): 50 a 100 mL por infusão.
Se necessário, repetir a infusão durante 2 a 3 dias ou a critério do médico-veterinário.

Precauções:

Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações na dosagem indicada e a fazer a aplicação (infusão) do produto.
A infusão uterina deve ser realizada por pessoa habilitada, caso contrário, poderão ocorrer acidentes, como perfurações uterinas.
Não misturar no frasco do **Gentrin Infusão Uterina** nenhum outro tipo de medicamento.

Contraindicação:

O produto é contraindicado para animais com histórico de hipersensibilidade à Gentamicina.
Não administrar o produto a animais com função renal comprometida.

Reações adversas:

Há possibilidade de reações alérgicas à Gentamicina quando os animais são hipersensíveis.
Pode ocorrer ototoxicidade ou nefrotoxicidade em tratamentos

prolongados, porém, a reversão desses quadros geralmente ocorre após a suspensão do tratamento.
Uma reação mais rara é o bloqueio neuromuscular, que é revertido com a aplicação de gluconato de cálcio.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

EQUÍDEOS (*Equus caballus*/CAVALOS) E SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Incompatibilidades:

A Gentamicina é inativada pela administração concomitante de carbenicilina.

Não administrar o produto concomitantemente com relaxantes músculo-esqueléticos, pois aumenta a possibilidade de bloqueio neuromuscular.
Não administrar o produto concomitantemente com furosemida ou anfotericina B, pois aumenta a possibilidade de ototoxicidade e nefrotoxicidade.

Conservar em local seco e fresco, entre 5°C e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3.821 em 11/10/91.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE
EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA
PAPEL

50004244/0320 OF00

ourofino saúde animal