

# Sincro eCG® 6000

USO VETERINÁRIO

Gonadotrofina coriônica equina (eCG) 6.000 U.I.

Hormônio natural.

Pó liofilizado para reconstituir solução injetável.

Agente estimulante do crescimento folicular e indutor de superovulação em Bovinos.

## Fórmula:

**Cada frasco de pó liofilizado contém:**

eCG (gonadotrofina coriônica equina) ..... 6.000 U.I.  
Excipientes q.s.p.

**Cada frasco de diluente contém:**

Água para injeção ..... 30 mL

**Cada 1 mL de produto reconstituído contém:**

eCG (gonadotrofina coriônica equina) ..... 200 U.I.  
Excipientes q.s.p. .... 1 mL

## Indicações principais:

A gonadotrofina coriônica equina (eCG) possui atividade foliculo estimulante e luteinizante, o que lhe confere possibilidade de uso no controle da reprodução e em processos patológicos reprodutivos. A estimulação do crescimento folicular leva a uma maior capacidade ovulatória, maximizando a taxa de prenhez. Sincro eCG é indicado para a estimulação do crescimento folicular e para a indução da superovulação em fêmeas bovinas em idade reprodutiva.

## Modo de uso e dosagens:

Para diluição, adicionar 5 mL do diluente estéril no frasco contendo o liofilizado de 6.000 UI de eCG, homogeneizar e devolver o volume com o liofilizado ao frasco de diluente. Sugere-se que o volume de 5 mL seja adicionado parcialmente (2 a 3 mL), para uma pré diluição, repetindo o procedimento, caso necessário.

## Doses:

**Estimulante de desenvolvimento folicular:**

Administrar uma dose de 300 UI/animal, ou seja, 1,5 mL de **Sincro eCG 6000** por via intramuscular profunda.

**Indutor de múltiplas ovulações:** Administrar uma dose de 500 UI/animal, ou seja, 2,5 mL de **Sincro eCG 6000** por via intramuscular profunda.

A dose por animal é única e não depende do peso dos animais.

A resposta da utilização de medicamentos hormonais depende do bom estado corporal em que o animal se encontra e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas. Um correto manejo nutricional na propriedade é imprescindível, uma vez que as características reprodutivas são de baixa herdabilidade e, conseqüentemente, são muito mais influenciadas pelo meio. Uma vez que os protocolos terapêuticos reprodutivos são bastante diferenciados, fica a critério do médico-veterinário a definição da melhor combinação farmacológica para o protocolo reprodutivo a ser adotado.

## Contraindicações e limitações de uso:

O uso de **Sincro eCG 6000** é contraindicado para animais com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, assim como em fêmeas prenhes. Não utilizar o produto em animais que não estejam em idade reprodutiva. Doses elevadas produzem superovulação, não sendo aconselhável para animais a serem inseminados ou cobertos (monta natural) em virtude da possibilidade de gestações múltiplas. Não utilizar o produto fora do prazo de

validade.

## ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

### BOVINOS:

**O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS TRATADOS.**

**O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### Precauções em animais:

Uso exclusivo em fêmeas bovinas.

### Precauções em humanos:

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luvas nitrílicas). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia e adotando os devidos cuidados na manipulação.

Em caso de auto injeção acidental, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem e bula do produto. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não misturar a outros produtos. Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Não utilize o produto com prazo de validade vencido e considere sua validade de uso após reconstituição.

**Leia a bula atentamente antes de**

administrar o produto.

### Reações adversas:

O produto, quando usado nas dosagens indicadas, não provoca reações adversas. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer. Nestes casos, indica-se o tratamento sintomático. Pode ocorrer edema transitório no local de administração, geralmente sem a necessidade de tratamento.

Conservar o produto na embalagem original, sob refrigeração, em temperatura entre 2°C a 8°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não congelar. Após reconstituição, o produto poderá ser mantido por até 7 dias sob refrigeração em temperatura de 2°C a 8°C.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005-1.000032 em 18/02/2021.

### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

## PRODUTO IMPORTADO

### Proprietário:

**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Indústria brasileira



PAPEL

**Ouro SAC**  
**16 3518 2025**  
Telefone ou WhatsApp  
(seg. a sex. das 8h às 17h)



### Fabricante:

**Ningbo Second Hormone Factory**  
No. 28, Renjian Road  
Zonghan Subdistrict Cixi, Ningbo  
Zhejiang Province - China

**ourofino**  
saúde animal