

Brinco Mosquicida Na MOSCA

Uso Veterinário

Brinco com 40% de Diazinon

Fórmula:

Cada brinco de 15 g contém:

Diazinon 6,0 g

Veículo q.s.p. 15,0 g

Indicações:

Brinco Mosquicida Na MOSCA é um brinco para fixação na orelha de bovinos, que permite uma liberação lenta do diazinon, indicado como auxiliar no controle e tratamento de infestações exclusivamente pela mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*).

Modo de uso e dosagens:

Produto de uso externo, exclusivo para fixação na orelha dos animais. O brinco deve ser fixado na face externa da orelha, de maneira que sua fixação ocorra entre a segunda e a terceira cartilagem, enquanto o inserto (macho) permanece na face interna, conforme a ilustração, com o auxílio de um aplicador específico para esta finalidade.

Intervalo entre a troca de brincos:

A frequência com que o brinco deverá ser trocado dependerá da infestação e do manejo integral da praga baseado no limiar de infestação e na dinâmica populacional. Em média, recomenda-se que o brinco seja trocado após quatro meses decorridos da sua fixação, pois a partir deste período a queda da concentração de ativo nos brincos pode ocasionar resistência por parte dos parasitos.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de

pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, consequentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Contraindicações:

Não utilizar em animais com menos de 3 meses de idade, pois sua fixação pode acarretar dano às orelhas destes animais.

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido. O produto mantém preservadas as suas características de fabricação até o último dia do prazo de validade.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações no modo de uso do produto. Seguir o modo de uso para aplicação do produto, evitando-se a perfuração dos vasos sanguíneos na cartilagem auricular.

O leite produzido enquanto os animais permanecerem com o brinco, não pode ser destinado ao consumo humano. Respeitar o período de carência descrito nesta bula.

Não foram realizados estudos de segurança com animais prenhes.

Precauções em humanos:

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando consigo a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Em caso de inalação ou aspiração, procure um local arejado, se a irritação persistir consulte um médico, levando consigo a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.

Durante o manuseio do brinco, o aplicador não deverá comer, beber ou fumar. Não misturar a outros produtos. Limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza. Produto tóxico para peixes e aves.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06 HORAS APÓS A RETIRADA DO BRINCO. LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 01 DIA APÓS A RETIRADA DO BRINCO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Reações adversas:

Reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Em caso de sensibilidade individual, sobredose ou intoxicações acidentais, poderão ocorrer efeitos adversos tais como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispneia, fasciculação, ataxia e convulsões. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Interações Medicamentosas:

O uso concomitante com outros organofosforados e carbamatos pode potencializar a toxicidade colinérgica do diazinon. A toxicidade dos organofosforados também pode ser alterada na presença de fármacos que possuem propriedades bloqueadoras neuromusculares, tais como anestésicos voláteis, ion de magnésio e fármacos que competem com os organofosforados por esterases-alvo como a succinilcolina, fenotiazina e procaina. Outros compostos podem interferir com a toxicidade do diazinon indiretamente, tais como hipnóticos e sedativos (barbitúricos); anti-inflamatórios

(fenilbutazona); analgésicos (aspirina, morfina), anti-histamínicos (difenidramina), inseticidas (DDT, BHC, aldrin, dieldrin, piretrinas) e hormônios esteroides (testosterona, progesterona, cortisona).

Informações para uso médico:

Grupo químico: Composto

Organofosforado;

Ingrediente ativo: Diazinon;

Ação Tóxica: Inibidor das colinesterases;

Antídoto/Tratamento: Sulfato de atropina e oximas. Efetuar tratamento sintomático.

Nas toxicoses por agentes anticolinesterásicos é contraindicado o uso concomitante de succinilcolina, tranquilizantes fenotiazínicos e outros medicamentos causadores de depressão respiratória, além de procaina, compostos com magnésio, anestésicos inalatórios, agentes bloqueadores neuromusculares, antibióticos aminoglicosídeos, clindamicina, lincomicina, polimixinas A e B, colistina e teofilina.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após a abertura da embalagem, utilizar imediatamente todos os brincos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.022 em 17/01/2005.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508.



ATENÇÃO

Fatal se ingerido. Tóxico em contato com a pele. Pode provocar câncer. Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Lave cuidadosamente após o manuseio. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular.

Classe 6 – Grupo de embalagem II

UN 2783

PESTICIDA À BASE DE ORGANOFOSFORADOS, SÓLIDO, TÓXICO (Diazinon)

Para mais informações ou em caso de emergência ou exposição, consulte a **Ficha de Dados de Segurança (FDS)**, disponível no **nosso site** ou no **QR Code ao lado**, ou entre em contato com o nosso **Ouro SAC 16 3518 2025**.



SE NECESSÁRIO, PROCURE UM MÉDICO LEVANDO ESTA BULA OU A FDS.

CUIDADO  **VENENO**

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



5006627/025-0100


 **ourofino**
saúde animal

Colocação Brinco Mosquicida Na MOSCA®



Modo de usar:

- Desinfetar o aplicador antes do uso.
- Uso externo, o brinco deve ser colocado na parte externa da orelha, em sua porção mediana, de maneira que sua fixação ocorra entre a segunda e a terceira cartilagem, com auxílio de um aplicador, conforme o diagrama ao lado indicado:


1 - Introduza o macho no pino do aplicador e empurre para cima até o encaixe completo.



2 - Coloque a fêmea (brinco) pressionando a alavanca, de maneira que o anel de segurança esteja direcionado para fora do aplicador, alinhando a ponta do macho com a perfuração do brinco (fêmea).



3 - Posicionar o aplicador no centro da orelha do animal. Aplicar o brinco entre a segunda e a terceira cartilagem.



4



Posição correta para a permanência do brinco no animal.