

Diclofenaco 50

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Diclofenaco sódico 5,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

O **Diclofenaco 50** é um analgésico com atividade anti-inflamatória indicado para bovinos e suínos em casos de dor e inflamação.

Modo de uso e dosagens:

Diclofenaco 50 deve ser administrado pela via intramuscular, por até 03 dias consecutivos, na dosagem de 1 mg/kg, ou seja, 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:

Peso (kg)	Dose (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL

1 mL a cada 50 kg

As dosagens e os intervalos entre os tratamentos poderão ser alterados a critério do médico-veterinário.

Precauções:

- Obedecer às dosagens indicadas

para a aplicação do produto.

- Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.

- É importante, durante o tratamento com o Diclofenaco, o acompanhamento cuidadoso em animais portadores de sintomas indicativos de distúrbios gastrintestinais, com histórico que sugira ulceração gástrica ou intestinal.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar o Diclofenaco em animais com ulcerações gástricas e ou intestinais.

O Diclofenaco é contraindicado para animais que apresentam hipersensibilidade à droga. Não administrar o produto a animais com grave problema de disfunção renal.

Interações medicamentosas:

A administração concomitante com outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou glicocorticoides pode resultar numa somatória das ações farmacológicas. Embora as investigações clínicas não pareçam indicar, existem relatos de elevação

do risco de hemorragias com o uso concomitante de Diclofenaco e anticoagulantes. Nesses casos, é recomendável uma monitoração do animal a ser tratado.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA**

BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06
DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
NÃO DEVE SER DESTINADO AO
CONSUMO HUMANO ATÉ 08 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE
PRODUTO.**

SUÍNOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06
DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS
ACIMA DOS LIMITES APROVADOS,
TORNANDO O ALIMENTO DE
ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA
O CONSUMO.**

Efeitos adversos:

Há relatos de ulceração estomacal e da mucosa intestinal, em tratamentos muito prolongados.

Pode ocorrer exantema cutâneo, edemas e, raramente, depressão da função renal, em tratamentos prolongados.

**Conservar em local seco e fresco
ao abrigo da luz solar, em
temperatura entre 15°C e 30°C,
fora do alcance de crianças e
animais domésticos. Após aberto,
o produto deverá ser utilizado em
até 06 meses.**

**Venda sob prescrição e aplicação
sob orientação do
médico-veterinário.**

Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº SP
000005-1.000012 em 19/10/99.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira

 Atendimento
16 3518 2025

 Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



5000496/0720 OF00

 **ourofino**
saúde animal