



USO VETERINÁRIO

Endectocida de amplo espectro para bovinos à base de Ivermectina e Sulfóxido de Albendazol

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ivermectina 0,80 g

Sulfóxido de

Albendazol 10,0 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações principais:

A Ivermectina é um derivado semissintético das avermectinas, que são um grupo de lactonas macrocíclicas quimicamente relacionadas e que são produzidas pela fermentação do fungo *Streptomyces avermitilis*. Esta molécula é altamente ativa contra um grande número de espécies de nematódeos pulmonares e gastrintestinais, bem como sarnas, carrapatos, moscas e larvas de dípteros. O Sulfóxido

de Albendazol, um fármaco da classe dos benzimidazóis, é indicado para tratamento de doenças causadas por parasitas gastrointestinais, tanto em suas formas larvais quanto adultas. Atua em nematódeos, cestódeos e alguns protozoários, sendo também eficaz em parasitoses hepáticas e pulmonares.

evol é um endectocida de amplo espectro para bovinos, indicado para o tratamento e controle dos nematódeos gastrointestinais *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei*; tratamento e controle de infestações por *Dermatobia hominis* (berne) e pelo carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Modo de uso e dosagens:

Agitar o produto antes de usar.

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 01 (um) mL para cada 40 kg de peso vivo, conforme quadro abaixo:

Peso	Dosagem de evol
40 kg	1 mL
100 kg	2,5 mL
200 kg	5 mL
300 kg	7,5 mL
400 kg	10 mL
500 kg	12,5 mL
1 mL a cada 40 kg	

Dosagem equivalente a 0,2 mg de Ivermectina e 2,5 mg de Sulfóxido de Albendazol por quilograma de peso vivo.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades

diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Contraindicações:

Não foram conduzidos estudos de segurança em animais com idade inferior a dois meses. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Não administrar o produto pelas vias intravenosa ou intramuscular. Não foram realizados estudos de segurança com animais prenhes.

Precauções em humanos:

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Em caso

de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de

embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA**

BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE
PRODUTO SOMENTE DEVE SER
REALIZADO 22 DIAS APÓS A
ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO
DEVE SER APLICADO EM
FÊMEAS PRODUTORAS DE
LEITE PARA O CONSUMO
HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
EM CONDIÇÕES DIFERENTES
DAS INDICADAS NESTA BULA
PODE CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Reações adversas:

Não são esperadas reações

adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático. Pode ocorrer edema transitório e a formação de nódulo no local da administração, geralmente sem a necessidade de tratamento. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Informações para uso médico:

Grupo químico:

Avermectina/Benzimidazólico;

Ingrediente ativo:

Ivermectina/Sulfóxido de albendazol;

Ação Tóxica:

Estimula a liberação do ácido GABA, provocando paralisia/Inibição da enzima fumarato redutase;

Antídoto/Tratamento:

Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático.

Conservar o produto em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da

luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 04 meses, desde que mantido em condições adequadas de armazenamento e esterilidade.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005-1.000062 em 30/07/15.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della
Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira



52006873/0923 OF10

  **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



 **ourofino**
saúde animal