

Iver Gel Composto

USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada seringa de 9,60 g contém:

Ivermectina	0,120g
Praziquantel	1,500g
Vitamina E	0,600g
Veículo q.s.p.	9,600g

Indicações principais:

Iver Gel Composto é indicada para o controle dos principais parasitas internos dos equinos, como: *Trichostrongylus axei*, *Oxyuris equi*, *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus serratus*, *Probstmayria vivipara* e *Cyathostominae*.

Modo de uso e dosagem:

Iver Gel Composto deve ser administrado por via oral, exclusivamente para equinos, aplicando sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento, na dosagem de 1,60 g para cada 100 kg de peso, obedecendo à graduação que consta no êmbolo da seringa, sendo que a seringa completa é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal, em dose única.

As doses são graduadas para: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg e 600 kg.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade como instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, consequentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Contraindicações:

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. A exposição direta à luz solar ou à altas temperaturas poderá degradar o produto.

Não foram realizados estudos de segurança com animais prenhes.

Precauções em humanos:

Cuidado! Pode ser irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto. Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão accidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Lavar muito bem as mãos e a parte

exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Interações Medicamentosas:

Não misturar a outros produtos.

O uso concomitante com

Dexametasona reduz a eficácia do Praziquantel.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUÍDEOS (*Equus caballus*/CAVALOS)

ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO

Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Os componentes da fórmula do produto apresentam elevada margem de segurança para equinos (três vezes a dose recomendada). Apenas quando usadas doses excessivamente altas os animais podem apresentar sinais nervosos (ataxia, depressão e perda temporária da visão) e sinais de

desconforto gástrico (náusea e cólica). Não há antídoto, o tratamento deve ser sintomático.

Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Informações para Uso Médico:

Grupo químico: Avermectina/
Derivativo Pirazinoisoquinolina;

Ingrediente ativo: Ivermectina/
Praziquantel;

Ação Tóxica: Estimula a liberação do ácido GABA, provocando paralisia/
Atividade sobre as enzimas Na⁺/K⁺ ATPase e Ca²⁺/Mg²⁺ ATPase, aumentando a permeabilidade da membrana;

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000005-1.000066 em 05/07/2001.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



Ouro SAC
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)

 **ourofino**
saúde animal