

Iver OF[®]

USO VETERINÁRIO

Endectocida à base de Ivermectina

Fórmula:

Cada 100 mL contém :

Ivermectina 1,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

A ivermectina é um derivado semi-sintético das avermectinas, que são um grupo de lactonas macrocíclicas quimicamente relacionadas, que são produzidas pela fermentação do *Streptomyces avermitilis*.

Iver OF é um endectocida para bovinos de amplo espectro, indicado no tratamento de nematódeos gastrintestinais e bernes.

Parasitas para os quais o uso de **Iver OF** é indicado:

Nematódeos gastrintestinais:

Haemonchus placei, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Trichuris discolor*, *Trichostrongylus axei*, *Oesophagostomum radiatum* (helmintos adultos). *Haemonchus* spp., *Cooperia* spp., *Trichostrongylus* spp. e *Oesophagostomum* spp. (formas imaturas).

Bernes: Larvas de *Dermatobia hominis*.

Contraindicações:

Não administrar o produto por via intravenosa ou intramuscular. Os benzodiazepínicos podem ser potencializados com o uso de ivermectina.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos e semi-confinamentos ou em bovinos de corte criados em regime extensivo na fase de terminação.

Modo de uso e dosagens:

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme o quadro abaixo:

Peso (kg)	Dose (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL
1 mL a cada 50 kg	

Dosagem equivalente a 200 µg de Ivermectina por kg de peso corporal.

Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, consequentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido. Não aplicar em

animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Precauções em humanos:

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Durante a aplicação, utilizar luvas de borracha (luva nitrílica).

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 19 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas

com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático.

Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Informações para uso médico:

Grupo químico: Avermectina;

Ingrediente ativo: Ivermectina;

Ação Tóxica: Estimula a liberação do ácido GABA, provocando paralisia;

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Realizar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, consumir o produto em até 6 meses

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005-1.000007 em 24/04/95.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e acesse nosso Áudio Bula.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira



5000564/1222 CFCO



Atendimento
16 3518 2025



Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



ourofino
saúde animal