

Master LP

USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ivermectina 4,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações principais:

A Ivermectina é um derivado semissintético das Avermectinas, que são um grupo de lactonas macrocíclicas quimicamente relacionadas, que são produzidas pela fermentação de um fungo habitante do solo, o *Streptomyces avermitilis*. É altamente ativa contra um grande espectro de espécies de nematódeos. A formulação de longa ação garante um processo de absorção mais lento a partir do espaço subcutâneo e uma maior persistência de concentrações na corrente sanguínea e nos tecidos onde o parasita está localizado. O uso estratégico da Ivermectina de longa ação é direcionado para aumentar o período de proteção do medicamento reduzindo os custos de produção dos criadores. O grau de melhoria do controle de parasitas resulta na melhora da saúde animal e na diminuição da contaminação das pastagens.

Master LP é um endectocida para bovinos, indicado no controle de nematódeos gastrintestinais, com ação prolongada contra bernes e carrapatos.

Nematódeos gastrintestinais:

Cooperia pectinata, *Oesophagostomum radiatum*, *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata* e *Trichuris discolor*.

Parasitos externos:

Bernes: Larvas de *Dermatobia hominis*.

Carrapatos: *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*.

Estudos realizados com o produto demonstraram uma ação prolongada, com eficácia bernicida por até 70 dias e eficácia carrapaticida por até 87 dias após o tratamento.

Este produto teve a eficácia comprovada por meio de testes, porém é possível o desenvolvimento de resistência dos carrapatos, reduzindo sua eficácia. Recomenda-se realização do teste de biocarrapatograma. Procure um médico veterinário para maiores esclarecimentos.

Produto seguro para uso em bovinos

adultos e bezerras com idade superior a 15 dias, em fêmeas gestantes e machos reprodutores quando utilizado de acordo com as recomendações do fabricante.

Modo de uso:

Aplicar pela via subcutânea, preferencialmente, no pescoço (tábua do pescoço) do animal.

Antes da aplicação do produto, a região deve ser limpa, desinfetada e seca.

Dosagens:

Aplicar na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme o quadro abaixo:

Peso (kg)	Volume (mL)
50 kg	1,0 mL
100 kg	2,0 mL
200 kg	4,0 mL
300 kg	6,0 mL
400 kg	8,0 mL
500 kg	10,0 mL
1 mL a cada 50 kg Dosagem equivalente a 800 µg de Ivermectina por kg de peso corporal.	

Volumes maiores que 10 mL deverão ser divididos em dois ou mais pontos de aplicação.

Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, consequentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Contraindicações:

Não administrar o produto por via intravenosa ou intramuscular. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto. De acordo com a Instrução Normativa nº 48/2011, o **Master LP**, assim como

qualquer outra avermectina com período de carência maior que 28 dias, tem seu uso proibido em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semiconfinamentos e em regime extensivo na fase de terminação. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Precauções em animais:

Aplicar somente pela via subcutânea. Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Precauções em humanos:

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Obedecer às normas de assepsia na administração deste produto.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Não jogar embalagens vazias em rios ou lagos. Produto tóxico para peixes.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Nestes casos, indica-se tratamento sintomático. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Interações Medicamentosas:

Os benzodiazepínicos podem ser potencializados com o uso de Ivermectina.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 37 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICAÇÕES NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Informações para uso médico:

Grupo químico: Avermectina;

Ingrediente ativo: Ivermectina;

Ação Tóxica: Estimula a liberação do ácido GABA, provocando paralisia;

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico. Realizar tratamento sintomático.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses, desde que mantido em condições adequadas de armazenamento e esterilidade.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº SP 000005-1.000002 em 14/03/2006.



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera SP 330 km 298

CEP: 14140 000 Cravinhos SP

CNPJ: 57.624.462/0001-05

www.ourofino.saudeanimal.com

Indústria brasileira



XXXXXX
XXXXXXXXXX
FSC® XXXXXXXX



Ouro SAC
16 3518 2025

Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



50004326/0324-0160

ourofino
saúde animal