

Mastifin[®]

Uso Veterinário

Antimicrobiano intramamário à base de Gentamicina para bovinos

Fórmula:

Cada seringa de 10 g contém:
Gentamicina (como Sulfato)* 150,00 mg
Excipiente q.s.p. 10,00 g
*Equivalente a 254,24 mg de Sulfato de Gentamicina.

Farmacocinética e Farmacodinâmica:

A Gentamicina é um antimicrobiano da classe dos aminoglicosídeos que atua inibindo de forma irreversível a síntese de proteínas. Inicialmente, há a penetração do fármaco através do invólucro celular, que ocorre tanto por transporte ativo como por difusão passiva. Após ter penetrado na célula liga-se a receptores existentes sobre as subunidades 30S do ribossoma bacteriano e a síntese ribossômica de proteínas é inibida.

Aminoglicosídeos são compostos básicos, de baixo peso molecular e muito polares. A meia-vida de eliminação sistêmica é curta, de 1 a 2 horas e o volume de distribuição é relativamente baixo: < 0,35 L/kg. Quando aplicada pela via intramamária, a Gentamicina é um princípio ativo de baixa absorção. Sua inativação nos tecidos é limitada, sendo eliminada em sua forma ativa (inalterada), pela via renal, por meio de filtração glomerular. Para determinação da eficácia do produto frente aos microrganismos de interesse realizou-se a determinação da farmacocinética do **Mastifin** no tecido da glândula mamária e no leite residual e os resultados seguem abaixo:

	Tecido de glândula mamária	Leite Residual
T _{max} * (horas)	12	12
C _{max} ** (µg/kg)	13.493,69	64.534
T _{1/2} *** (horas)	12,32	9,75
ASC0-t**** (h*µg/kg)	335.623,50	1.281.510,38

* Tempo para atingir a concentração máxima (no leite ou tecido);

** Concentração máxima (no leite ou tecido);

*** Meia-vida de eliminação;

**** Área sob a curva de concentração plasmática;

Indicações:

Mastifin é indicado no tratamento de mastite dos bovinos, causadas por microrganismos sensíveis à Gentamicina, tais como: *Corynebacterium bovis*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae* e *Trueperella pyogenes*.

Modo de uso e dosagem:

Realizar, quando necessária, a lavagem do teto e seguir com manejo de higienização através do *pré-dipping*. Após a ordenha aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g de **Mastifin** em cada quarto afetado. Após a aplicação, massagear o teto de baixo para cima no úbere, para uma melhor dispersão do produto na glândula mamária. Após o uso do produto, realizar a higienização dos tetos pós ordenha, por meio do *pós-dipping*. **Mastifin** deve ser aplicado em cada quarto afetado por 3 dias consecutivos, com intervalos de 24 horas entre as aplicações.


Aplicação de Mastifin passo a passo



1º Passo:
Realizar a ordenha completa do quarto afetado.



2º Passo:
Limpar e desinfetar o teto (com toalha descartável).



3º Passo:
Introduzir a cânula.



4º Passo:
Aplicar todo o conteúdo de 1 seringa (10g).



5º Passo:
Fazer massagem de baixo para cima.

A eficácia de antimicrobianos depende da sensibilidade dos microrganismos ao princípio ativo que compõe o produto e do atendimento

adequado às recomendações do médico-veterinário que prescreveu o medicamento, como dose, intervalo entre as doses e tempo de tratamento.

Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Precauções em humanos:

Durante a utilização do produto, recomenda-se o uso de luvas de borracha (luva nitrílica). Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Cuidado! Irritante para a pele. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se houver irritação e esta persistir, consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Antídotos:

Não há antídoto específico. O tratamento baseia-se na interrupção da terapia antimicrobiana e nos casos em que eventual toxicidade renal seja constatada, deve-se realizar fluidoterapia intensa a fim de manter a função renal equilibrada e acelerar a eliminação do agente.

Interações medicamentosas:

O uso concomitante ou sequencial de outros fármacos potencialmente nefrotóxicos, assim como com agentes bloqueadores neuromusculares e anestésicos em geral, deve ser evitado.

A utilização com antibióticos beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas) pode resultar em efeitos sinérgicos contra algumas bactérias. Evitar associar o uso de gentamicina a diuréticos de alça (furosemida) ou osmóticos (manitol), pois leva ao aumento do risco de nefrotoxicidade e ototoxicidade.

Os aminoglicosídeos são fisicamente incompatíveis com vários medicamentos.

Advertências:

Seguir as orientações desta bula para utilização do produto.

Contraindicações e limitações de uso:

O produto não deve ser utilizado em animais que apresentam hipersensibilidade aos componentes da formulação, assim como deve ser usado com cautela e sob a supervisão de médico-veterinário em animais quando o animal a ser tratado apresentar função renal comprometida.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 22 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 180 HORAS (7,5 DIAS) APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005-1.000026 em 10/10/90.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508.



Leia o QR code e acesse nosso Áudio Bula.

Proprietário e fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



Atendimento
16 3518 2025



Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



PAPEL

50004725 (0-21) OF00