

Mastifin[®] Vaca Seca

USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada seringa de 10 g contém:

Sulfato de

Gentamicina 677,00 mg*

Excipiente q.s.p. 10,00 g

*Equivalente a 400,00 mg de
Gentamicina base.

Indicações:

Para o tratamento das mastites fora do período de lactação ("Vaca Seca").

Mastifin Vaca Seca possui uma formulação especial desenvolvida para o tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação, com uma ação prolongada, que se estende por 4 semanas. A ação bacteriana da Gentamicina atinge os principais agentes Gram-positivos e Gram-negativos causadores das mastites dos bovinos.

Agentes: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Corynebacterium* spp, *Escherichia coli*, *Micrococcus* spp, *Pseudomonas* spp, *Klebsiella* spp, *Serratia* spp, *Proteus* spp, *Enterobacter* spp.

Modo uso e dosagem:

Após a última ordenha da lactação e a desinfecção dos tetos, aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g em cada quarto do úbere, em dose única.

Recomenda-se fazer uma massagem de baixo para cima no úbere, para melhor dispersão do produto por toda a glândula mamária.

Contraindicações:

Não aplicar em vacas com histórico de hipersensibilidade à Gentamicina.

Não aplicar em vacas em lactação.

Não aplicar em animais com problema de insuficiência renal.

Interações medicamentosas:

A Gentamicina é inativada pela administração concomitante de carbenicilina.

Não administrar Gentamicina concomitantemente com relaxantes

músculo-esqueléticos, pois aumenta a possibilidade de bloqueio neuromuscular.

Não administrar Gentamicina concomitantemente com

Furosemida ou Anfotericina B, pois aumenta a possibilidade de ototoxicidade e nefrotoxicidade.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA**

BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
28 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO
DEVE SER APLICADO EM
FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE
PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Reações adversas:

Há possibilidade de reações alérgicas à Gentamicina, quando os animais são hipersensíveis. Podem ocorrer ototoxicidade e nefrotoxicidade em tratamentos prolongados, porém, a reversão desses quadros geralmente ocorre após a suspensão do tratamento.

Uma reação mais rara é o bloqueio neuromuscular, que é revertido com a aplicação de

gluconato de cálcio.

Restrições de uso:

**Venda sob prescrição e
aplicação sob orientação do
médico-veterinário.**

Conservar em local seco e fresco, entre 5°C e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000005-1.000068 em 11/01/99.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline
Della Nina
Pistoni CRMV/SP
24.508.



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira



50004686 0225 OF00



**Ouro SAC
16 3518 2025**

Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



XXXXX
XXXXXXXXXX
FSC® XXXXXXXX