

Fortemil®

USO VETERINÁRIO

Soro Energético e Hidratante com Vitaminas. Solução Injetável

Composição:

Cada 500,0 mL contém:	
Riboflavina (Vitamina B ₂)	20 mg
Nicotinamida (Vitamina B ₃)	1000 mg
Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B ₆)	15 mg
Cianocobalamina (vitamina B ₁₂)	10 mg
N-Acetil DL-Metionina	660 mg
Cloreto de Sódio	3500 mg
Cloreto de Potássio	250 mg
Cloreto de Cálcio	150 mg
Cloreto de Magnésio	90 mg
Dextrosa	25000 mg
Excipientes q.s.p.	500 mL

Indicações:

Fortemil é indicado para auxiliar no tratamento e suplementação nos casos de deficiência de vitaminas, aminoácidos, minerais em bovinos, suínos e equinos.

Modo de uso e dosagens:

O produto **Fortemil** deve ser administrado utilizando-se equipo apropriado para a aplicação de soro. Está indicado para as espécies bovina, equina e suína, de acordo com as faixas de peso e vias de administração apresentadas na tabela abaixo:

Espécie	Peso	Dose	Via de Administração
Bovinos (carne e leite)	200 - 400 kg 400 - 800 kg	500 mL 1 L - 2 L	Intravenosa ou Subcutânea
Equinos	200 - 400 kg 400 - 800 kg	500 mL 1 L - 2 L	Intravenosa ou Subcutânea
Suínos	até 400 kg	500 mL	Intravenosa
Leitões (até o desmame)	-	5 mL/kg	Intraperitoneal

Interações medicamentosas:

Evitar o uso simultâneo de cloranfenicol com a piridoxina ou com a vitamina B₁₂, pois poderá causar um efeito antagonístico entre os mesmos.

Evitar o uso simultâneo de ácido ascórbico com a vitamina B₁₂, pois isso poderá acarretar a destruição da vitamina B₁₂.

Contraindicações e reações adversas:

O produto não é indicado para animais que tenham apresentado qualquer reação alérgica aos componentes da formulação.

Precauções:

Guardar o produto dentro da sua embalagem original, protegendo-o da luz, e somente retirá-lo no momento do uso.

Quando **Fortemil** for associado com cálcio injetável por via intravenosa, a administração deve ser muito lenta.

A aplicação intravenosa deve ser feita lentamente, sempre utilizando o equipo esterilizado que acompanha o produto.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Depois de aberto o frasco, o produto deverá ser completamente utilizado.

A disposição final de embalagens vazias ou com conteúdo residual deve ser realizada de acordo com as normas ambientais vigentes.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000005-1.000100 em 18/03/2025.

Responsável Técnica: Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e Fabricante/Fabricado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria Brasileira
Hecho en Brasil



Fortemil

Uso Veterinario

Suero Energético e Hidratante con Vitaminas.

Solución Inyectable

Composición:

Cada 500,0 mL contiene:

Riboflavina (Vitamina B₂) 20,0 mg
Nicotinamida (Vitamina B₃) . 1.000,0 mg
Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B₆) .. 15,0 mg
Cianocobalamina (vitamina B₁₂) .. 10 mg
N-Acetil DL-Metionina 660,0 mg
Cloruro de Sodio 3.500,0 mg
Cloruro de Potasio 250,0 mg
Cloruro de Calcio 150,0 mg
Cloruro de Magnesio 90,0 mg
Dextrosa 25.000,0 mg
Excipientes c.s.p. 500,0 mL

Indicaciones:

Fortemil está indicado para ayudar en el tratamiento y suplementación de casos de deficiencias de vitaminas, aminoácidos y minerales en bovinos, porcinos y equinos.

Modo de administración:

Fortemil debe administrarse utilizando un equipo apropiado para la aplicación de suero. Está indicado para las especies bovina, equina y porcina de

Dosis:

acuerdo con los rangos de peso y las vías de administración que figuran en la tabla a continuación.

Precauciones:

Almacene el producto en su embalaje original, protegiéndolo de la luz, y solo retírelo al momento de su utilización. Cuando **Fortemil** se asocia con la inyección intravenosa de calcio, la administración debe ser muy lenta. La aplicación intravenosa debe realizarse lentamente, siempre utilizando el equipo estéril que viene con el producto.

Contraindicaciones y reacciones adversas:

El producto no está destinado para animales que hayan mostrado alguna reacción alérgica a los componentes

Especie	Peso	Dosis	Vía de Administración
Bovinos (carne y leche)	200 - 400 kg 400 - 800 kg	500 mL 1 L - 2 L	Intravenosa o Subcutánea
Equinos	200 - 400 kg 400 - 800 kg	500 mL 1 L - 2 L	Intravenosa o Subcutánea
Cerdos	hasta 400 kg	500 mL	Intravenosa
Lechones (hasta el destete)	-	5 mL/kg	Intraperitoneal

de la formulación.

Tiempo de retiro: No aplica

Interacciones farmacológicas:

Evite el uso simultáneo de cloranfenicol con la piridoxina o cianocobalamina, debido a esto puede llevar a un efecto antagonista entre ellos.

Evite el uso simultáneo de ácido ascórbico con la cianocobalamina, debido a puede acarrear la destrucción de la cianocobalamina.

Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conservar a una temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz solar directa.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Después de abierto el frasco, el producto deberá ser utilizado completamente.

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

Consulte al Médico Veterinario.

Responsable Técnica: Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508 – Médica Veterinaria

Importado y distribuido por:

Bolivia: SENASAG Reg. PUV – N.º 009998/21 – Servi-Insumos Bolivia Import Export SRL. – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia / **Colombia:** Reg. ICA 5285-DB – Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia – Tel.: (57) 604 366-1429 / **Costa Rica:** Reg. MAG MV-6609 / **Ecuador:** Reg. 10AB-7358-AGROCALIDAD – PRODUCTOS NUTRICIÓN Y SERVICIOS PRONUTROS CIA. LTDA – Gaspar de Escalona N39-29 y Granda Centeno, Quito, Ecuador / **Guatemala:** Reg. BR211-07-05-12761 / **Honduras:** Reg.

MV-6550 / **México:** Reg. Q-7750-117 – Ouro Fino de México S.A de C.V – Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México. / **Nicaragua:** Reg. MV-13282 / **Panamá:** Reg.: MV-1497 / **Paraguay:** Reg.: SENACSA N° 19.349 – Agroveterinaria Provét de Manuel Carvallo Hab. N: 894. Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvallo. Reg.Prof.429. / **Perú:** Reg. SENASA F.F4.54.I.0200 – INVERSIONES NORVET S.A.C. – Jr. José De la Torre Ugarte N° 368, Oficina 203, Lince. Lima – Perú / **República Dominicana:** Reg. 3937 – PCN GROUP, S.R.L. – Ciriaco Ramirez No. 53, Santo Domingo, Rep. Dominicana

Proprietário e Fabricante/Fabricado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria Brasileira
Hecho en Brasil