

Sincro eCG[®]

USO VETERINÁRIO

Gonadotrofina coriônica equina injetável (eCG)

Fórmula:

Frasco com pó liofilizado:

Gonadotrofina coriônica
equina - eCG 6.000 U.I.
Excipientes q.s.p. 0,052

Frasco com diluente:

Água para injeção 30 mL

Cada 1 mL de produto reconstituído

contém:

Gonadotrofina coriônica
equina - eCG 200 U.I.
Excipientes q.s.p. 1 mL

Indicações:

Sincro eCG é recomendado para a estimulação do crescimento folicular levando assim a uma maior capacidade ovulatória das fêmeas bovinas em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e transferência de embrião em tempo fixo (TETF). Pode ainda ser utilizado para superovulação de fêmeas bovinas.

Modo de uso e dosagens:

Diluição do produto:

Para diluição, adicionar 5 mL do diluente estéril no frasco contendo o liofilizado de 6.000 UI de eCG, homogeneizar e devolver o volume com o liofilizado ao frasco de diluente. Sugere-se que o volume de 5 mL seja adicionado parcialmente (2 a 3 mL), para uma pré diluição, repetindo o procedimento, caso necessário.

Usos:

- Estimulante de desenvolvimento folicular (protocolos de IATF): Administrar uma dose de 300 UI, ou seja, 1,5 mL de Sincro eCG por via intramuscular profunda,

por animal.

- Indutor de múltiplas ovulações (protocolos de TETF em receptoras)

Administrar uma dose de 500 UI, ou seja, 2,5 mL de Sincro eCG por via intramuscular profunda, por animal.

A dose por animal é única e não depende do peso dos animais.

Uma vez que a resposta aos tratamentos hormonais é individualizada, os protocolos e dosagens utilizadas podem ser alterados a critério do médico-veterinário. A resposta da utilização de medicamentos hormonais depende do bom estado corporal do animal e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas. Um correto manejo nutricional na propriedade é imprescindível, uma vez que as características reprodutivas são de baixa herdabilidade e, conseqüentemente, são muito mais influenciadas pelo meio.

Contraindicações e limitações de uso:

O uso de **Sincro eCG** é contraindicado para animais com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Doses elevadas produzem superovulação não sendo aconselhável para animais a serem inseminados ou cobertos (monta natural) em virtude da possibilidade de gestações múltiplas, exceto para fins de transferência de embriões.

Não utilizar o produto em animais que não

estejam em idade reprodutiva.
Não utilizar o produto fora do prazo de validade.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

**BOVINOS: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções em animais:

Uso exclusivo em fêmeas bovinas.

Precauções em humanos:

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia adotando devidos cuidados na manipulação. Em caso de auto injeção acidental, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem e bula do produto. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não misturar a outros produtos. Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Conservar o produto na embalagem original, sob refrigeração, em temperatura entre 2°C a 8°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após reconstituído, o produto poderá ser mantido por até 7 dias sob refrigeração em temperatura de 2°C a 8°C.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob SP 000005-1.000065 em 07/10/2011.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

PRODUTO IMPORTADO

Proprietário, importador e distribuidor:
Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira

Fabricante:
Laboratório Biomega S.A.
Camino Paso Taborda s/n
Melo - Cerro Largo, Uruguay

 **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



 **ourofino**
saúde animal

Sincro eCG

USO VETERINARIO

Gonadotropina coriónica equina inyectable (eCG)

Composición:

Frasco con polvo liofilizado:

Gonadotropina coriónica
equina - eCG 6.000 U.I.
Excipientes c.s.p. 0,052 g

Frasco con diluyente:

Agua para inyectable 30 mL

Cada 1 mL de producto reconstituido

contiene:

Gonadotropina coriónica
equina - eCG 200 U.I.
Excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones:

Sincro eCG es indicado para uso en vacas para estimular el crecimiento folicular y para la inducción de la superovulación (transferencia de embriones).

Modo de uso y dosificación:

Dilución del producto:

Para la disolución, agrega 5,0 mL del diluyente estéril al frasco con liofilizado, homogenizar hasta la total disolución del liofilizado y posteriormente, reintroducir nuevamente esta solución en el frasco del diluyente, volviendo a mezclar correctamente.

Usos:

- Uso como Estimulante del desarrollo folicular (IATF o TETF):

Administre una dosis de 300 UI, o sea, 1,5 mL de **Sincro eCG** por animal, por vía intramuscular.

- Uso para la inducción de la superovulación (protocolo TETF):

Administre 500 UI de eCG, en la práctica 2,5 mL del producto reconstituido/animal, por vía intramuscular profunda, en el día 5° del protocolo.

La dosis por animal es única y no depende del peso de los animales.

La respuesta al uso de fármacos hormonales depende del buen estado corporal en el que se encuentre el animal y de la ausencia de causas de baja fertilidad como enfermedades reproductivas y endocrinas. Un correcto manejo nutricional es fundamental, ya que las características reproductivas son de baja heredabilidad y, en consecuencia, están mucho más influenciadas por el medio ambiente. Dado que los protocolos terapéuticos reproductivos son bastante diferentes, le corresponde al médico veterinario definir la mejor combinación farmacológica para el protocolo reproductivo a implementar.

Una vez que la respuesta al tratamiento hormonal es individualizada, se pueden cambiar los protocolos y la dosificación a criterio del médico veterinario.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

El uso de **SINCRO eCG** es contraindicado para animales que presenten hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Dosis elevadas producen superovulación, y no se recomiendan para animales que serán inseminados o cubiertos (monta natural), debido a la posibilidad de gestaciones múltiples, a excepción de los casos de transferencia de embriones.

No utilice el producto en animales que no están en edad reproductiva.

El éxito de la utilización de **Sincro eCG** depende de protocolos hormonales reproductivos adecuados, y de factores apropiados de manejo del rebaño que

reduzcan el anestro y aumenten las tasas de preñez, tales como nutrición y sanidad.

Precauciones animales:

Uso exclusivo en hembras bovinas.

Precauciones en humanos:

Durante la utilización del producto, protegerse con guantes de goma (guante nitrílico). No manipule el producto con las manos desprotegidas.

Utilice jeringas y agujas estériles, observándose las buenas prácticas de asepsia y adoptándose los debidos cuidados en la manipulación del producto.

En caso de auto inyección accidental, consulte un médico inmediatamente, tomando el embalaje e inserto del producto.

No comer, beber o fumar durante la aplicación. No mezclar a otros productos.

Obedezca las dosis recomendadas para uso del producto. Solamente el médico veterinario está apto a realizar alteraciones en las dosificaciones del producto.

No utilice el producto después de la fecha de vencimiento.

Los envases vacíos y restos de producto deben ser desechados conforme a la normatividad local vigente.

No desechar en ríos ni lagos.

Reacciones adversas:

No se esperan reacciones adversas cuando el producto es utilizado de acuerdo a las recomendaciones indicadas.

Reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia pueden ocurrir en animales susceptibles.

Tiempo de Retiro:

No hay tiempo de retiro para la carne y la leche de animales tratados.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conserve el producto en su envase original, bajo refrigeración a la temperatura de 2°C a 8°C, y protegido de la luz solar directa. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Después de la reconstitución, el producto puede conservarse durante un máximo de 7

días bajo refrigeración a una temperatura de 2°C a 8°C.

Consulte al médico veterinario.

Venta bajo fórmula del médico veterinario.

En Ecuador: Su venta requiere receta médica.

En México: Su venta requiere receta médica cuantificada.

Para uso exclusivo del médico veterinario.

En Perú: Venta bajo receta de prescripción restringida del médico veterinario.

Responsable técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP
24.508

Importado y Distribuido por:

Bolivia: SENASAG Reg. PUV - N.º 5796/13 - Servi-Insumos Bolivia Import Export SRL. - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia / **Colombia:** Reg. N.º ICA 917-MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia / **Ecuador:** Reg.9B2-2-14205-AGROCALIDAD - ISOVET S.A. General Anda Aguirre Oe5-208 y Machala. Quito - Ecuador / **Guatemala:** Reg.: MV-911 / **México:** Reg. Q-7750-118 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México / **Nicaragua:** Reg.: MV-13104 / **Panamá:** Reg.: MV-8265 / **Paraguay:** Reg. SENACSA N.º 14.272 - Agroveterinaria Provet de Manuel Carvallo Hab. N. 894. Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvallo. Reg.Prof.429 / **Perú:** Reg. SENASA: F.16.671.0253 - INVERSIONES NORVET S.A.C. - Jr. José De la Torre Ugarte N.º 368, Oficina 203, Lince. Lima - Perú. / **Venezuela:** Reg. INSAI2041PI33N075882 - Agrosuplidores FL, C.A. - RIF J-31353351-3, Asesor Técnico: M.V. Alejandro Linares.

Elaborado en Uruguay por:

Laboratório Biomega S.A.
Camino Paso Taborá s/n
Melo - Cerro Largo
Uruguay.

Para:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: +55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com