

Aba Gel Composto

Uso Veterinário

Antiparasitário de amplo espectro com Vitamina E
Vermífugo Completo e Vitaminado

Fórmula:

Cada seringa de 9,60 g contém:

Abamectina	0,120 g
Praziquantel	1,500 g
Vitamina E	0,600 g
Excipiente q.s.p.	9,600 g

Indicações:

Aba Gel Composto é indicado para o tratamento e controle dos principais parasitas internos dos equinos, como:

Nematódeos gastrintestinais:

Habronema spp,
Trichostrongylus axei,
Parascaris equorum,
Strongyloides westeri, *Oxyuris equi*, *Onchocerca* spp.

Grandes estrogilos:

Strongylus vulgaris, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*.

Pequenos Estrogilídeos:

Strongylinae: *Triodontophorus* spp.

Cyathostominae:

Cyathostomum spp,
Gyalocephalus spp,
Cylicodontophorus spp,
Cylicostephanus spp,
Cylicocyclus spp.

Nematódeo pulmonar:

Dictyocaulus arnfieldi.

Cestódeos: *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala mamillana*.

Larvas de Dípteros:

Gasterophilus nasalis.

Habronemose: *Habronema* spp e *Draschia* spp: Larvas cutâneas (ferida de verão ou esponja).

Modo de uso e dosagem:

Aba Gel Composto deve ser administrado por via oral, exclusivamente para equinos, aplicado sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento, na dosagem de 1,60 g para cada 100 kg de peso corporal, ou seja, 200 mcg de Abamectina, 2,5 mg de Praziquantel e 1mg de Vitamina E por kg de peso corporal, obedecendo a graduação que consta no êmbolo da seringa, sendo que a seringa completa é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal.

As doses são graduadas para: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg e 600 kg.

Precauções:

Após a aplicação, manter a cabeça do animal levantada por alguns segundos. Não jogar embalagens vazias em rios ou lagos. Produto tóxico para peixes e alguns organismos aquáticos. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

Contraindicações e limitações de uso:

Aba Gel Composto não possui contraindicações desde que se obedeça as indicações para o uso correto do produto.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUÍDEOS

(*Equus caballus*/CAVALOS)

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interação medicamentosa:

O uso concomitante com Dexametasona reduz a eficácia do Praziquantel.

Reações adversas:

O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações.

Conservar em local seco e fresco, entre 5°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 7.694 em 26/03/2001



Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira