

Aba Gel Composto

Uso Veterinário

Antiparasitário de amplo espectro com Vitamina E.
Vermífugo Completo e Vitaminado.

Fórmula:

Cada seringa de 9,60 g contém:

Abamectina	0,120 g
Praziquantel	1,500 g
Vitamina E	0,600 g
Excipiente q.s.p.	9,600 g

Indicações:

Aba Gel Composto é indicado para o tratamento e controle dos principais parasitas internos dos equinos, como:

Nematódeos gastrintestinais:

Habronema spp, *Trichostrongylus axei*, *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*, *Grandes estrôngilos* (*Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus* spp.), *Pequenos estrôngilos* (*Cyathostomum* spp, *Gyalocephalus* spp, *Cylicodontophorus* spp, *Cylicostephanus* spp, *Cylicocyclus* spp.)

Nematódeo ligamento nugal:

Onchocerca spp.

Nematódeo pulmonar:

Dictyocaulus arnfieldi.

Cestódeos: *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala mamillana*.

Larvas de Dípteros: *Gasterophilus nasalis*.

Habronemose cutânea (ferida de verão ou esponja): *Habronema* spp e *Draschia* spp.

Modo de uso e dosagem:

Aba Gel Composto deve ser administrado por via oral, exclusivamente para equinos, aplicado sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento, na dosagem de 1,60 g para cada 100 kg de peso corporal, ou seja, 200 µg de Abamectina, 2,5 mg de Praziquantel e 1 mg de Vitamina E por kg de peso corporal, obedecendo a graduação que consta no êmbolo da seringa, sendo que a seringa completa é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal.

As doses são graduadas para: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg e 600 kg.

Precauções:

Após a aplicação, manter a cabeça do animal levantada por alguns segundos.

Não jogar embalagens vazias em rios ou lagos. Produto tóxico para peixes e alguns organismos aquáticos.

Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

Contraindicações e limitações de uso:

Aba Gel Composto não possui contraindicações desde que se obedeça as indicações para o uso correto do produto.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUÍDEOS

(*Equus caballus*/CAVALOS)

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
21 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Interação medicamentosa:

O uso concomitante com Dexametasona reduz a eficácia do Praziquantel.

Reações adversas:

O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações.

Conservar em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 7.694 em 26/03/2001

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



50003346/0520 OF00