

# Cálcio Reforçado

Uso Veterinário

## Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Gluconato de cálcio ..... 20,00 g

Cloreto de

magnésio hidratado ..... 1,80 g

Hipofosfito de sódio ..... 3,10 g

Dextrose ..... 10,00 g

Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

## Indicações:

**Cálcio Reforçado** é indicado para bovinos, equinos e ovinos para a suplementação dos minerais cálcio, fósforo e magnésio, na prevenção e/ou tratamento de estados carenciais.

## Modo de uso e dosagens:

**Cálcio Reforçado** pode ser aplicado pelas vias intravenosa lenta, e subcutânea, obedecendo às dosagens abaixo:

**Bovinos e equinos acima de 02 anos:** 100 a 250 mL por via intravenosa lenta.

**Ovinos acima de 01 ano:** 50 a 100 mL por via intravenosa lenta. Em bovinos pode ser utilizada a via subcutânea dividindo-se a dose em dois pontos de aplicação.

As dosagens poderão ser modificadas, a critério do médico-veterinário.

## Contraindicações e limitações de uso:

O produto não deve ser aplicado em animais com bloqueio cardíaco, lesão miocárdica ou insuficiência renal grave.

A suplementação parenteral de cálcio associada ao potássio pode aumentar as chances de arritmias cardíacas, devendo ser realizada com cautela.

Não administrar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

## Precauções:

Utilizar equipo próprio para aplicação intravenosa bem lenta.

Aplicação intravenosa muito rápida pode causar hipotensão, arritmias e parada cardíaca. Pode causar hipercalcemia em animais com doenças cardíacas e renais.

A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS  
SEGUINTE**

**PERÍODOS DE CARÊNCIA**

**O PRODUTO NÃO REQUER  
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O  
ABATE DE BOVINOS, EQUINOS E  
OVINOS TRATADOS.**

**O PRODUTO NÃO REQUER  
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O  
CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS  
E OVINOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM  
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS  
INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA  
PODE CAUSAR A PRESENÇA DE  
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES  
APROVADOS, TORNANDO O  
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL  
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Reações adversas:**

O produto quando usado nas dosagens e vias de administração indicadas não provoca reações adversas.

**Interações Medicamentosas:**

Não associar com medicamentos que produzam depressão do sistema nervoso central.

Não utilizar cálcio em tratamentos concomitantes com digitálicos.

Antibióticos aminoglicosídeos por via intravenosa aumentam a excreção de cálcio.

Diuréticos furosemida e ácido etacrínico (inibidores da reabsorção de cloretos na alça de Henle) aumentam a excreção de cálcio.

Diuréticos tiazidas e amilorida (inibidores da reabsorção de

sódio nos túbulos distais) aumentam a reabsorção de cálcio.

Anti-inflamatórios (inibidores da síntese de prostaglandinas) aumentam a reabsorção tubular de cálcio e magnésio.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.643 em 13/12/2011.

**Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508.

**PARTIDA, FABRICAÇÃO E**

**VENCIMENTO:** vide área superior do frasco.

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofino.saudeanimal.com](http://www.ourofino.saudeanimal.com)  
Indústria brasileira



50002956 / 0716 CFCO