

Lepecid[®] BR spray

Uso Veterinário

Mata Bicheira

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Clorpirifós 5,00 g
Veículo q.s.p. .. 100,0 mL

Gás Propelente:

Butano/Propano 163 g por lata

Indicações principais:

Lepecid[®] BR spray é indicado no combate às miíases cutâneas (bicheiras) de bovinos.

Dosagens e modo de uso:

Aplicar o produto em toda a área afetada, bem como ao seu redor, mantendo o tubo de "spray" a uma distância de 10 - 20 cm da região a ser tratada.

Restrições de uso:

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto.

Interações medicamentosas:

A presença de outros compostos químicos pode alterar a toxicidade dos organofosforados. Dentre estes compostos podemos citar drogas que possuem propriedades bloqueadoras neuromusculares, tais como anestésicos voláteis, íon de magnésio, outros agentes

bloqueadores neuromusculares e drogas que competem com os organofosforados por esterases-alvo (succinilcolina, fenotiazina e procaína).

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto dentro da posologia recomendada.

A intoxicação por anticolinesterásicos como os organofosforados compreende uma série de sinais característicos como sialorreia, vômito, sudorese, cólicas abdominais, diarreia, bradicardia, bronco-constricção, incontinência urinária, tremores, fraqueza muscular, prostração e convulsões.

Precauções:

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Durante a administração evite que o produto atinja os olhos e boca do animal.

Recomenda-se um período mínimo de duas horas entre o tratamento e a exposição à chuva.

Não guardar ou aplicar junto de

alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Não comer ou beber durante o manuseio do produto. O contato com a pele, olhos e a boca deve ser evitado. Não desentupir válvulas com a boca. Não fumar durante a aplicação do produto; não utilizar próximo ao fogo, pois o gás é inflamável. Não reutilizar ou perfurar as embalagens vazias. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Não aplicar o produto contra o vento. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA**

**ABATE: O PRODUTO NÃO
REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA
PARA O ABATE DE BOVINOS
TRATADOS.**

**LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS
TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTE
RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A
PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA
DOS LIMITES APROVADOS,
TORNANDO O ALIMENTO DE
ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO
PARA O CONSUMO.**

Informações para uso médico:

Organofosforados: antídoto - sulfato de atropina e reativadores da colinesterase.

**Venda sob prescrição e aplicação
sob orientação do
médico-veterinário.**

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.825 em 10/07/2014.

Responsável Técnica:

Dra. Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817



Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

Fabricante:
Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares km 113, Caixa 611
Bairro Barreiro, Araçoiaba da Serra-SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52