

# Ivermectina OF

Uso Veterinário

## Endectocida injetável

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ivermectina ..... 1 g

Veículo q.s.p. .... 100 mL

Endectocida

Para o tratamento e controle de parasitas internos e externos dos bovinos, ovinos e suínos.

### Modo de uso e dosagens:

Para bovinos e ovinos:

Aplicar somente pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:

Peso (kg)	Volume (mL)
25 kg .....	0,5 mL
50 kg .....	1 mL
100 kg .....	2 mL
200 kg .....	4 mL
300 kg .....	6 mL
400 kg .....	8 mL
500 kg .....	10 mL

**Dosagem de 200 µg/kg de peso corporal.**

Para suínos

Aplicar somente pela via subcutânea na dosagem de 1 mL

para cada 33 kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:

Peso (kg)	Volume (mL)
16 kg .....	0,5 mL
33 kg .....	1 mL
66 kg .....	2 mL
132 kg .....	4 mL
198 kg .....	6 mL
264 kg .....	8 mL
330 kg .....	10 mL

**Dosagem de 300 µg/kg de peso corporal.**

### Indicações:

**Ivermectina OF** é um endectocida avançado, com amplo espectro de ação, que combate os nematódeos gastrintestinais e pulmonares, é berricida, sarnicida, piolhícida e ajuda no controle do carrapato dos bovinos.

### Espectro de ação para bovinos:

**Parasitas internos:**

1 - Nematódeos gastrintestinais:

*Ostertagia*

*ostertagi* .....adultos e imaturos (inclusive estágio inibido)

*Haemonchus placei* ..... adultos e imaturos

*Trichostrongylus*

*axeii* ..... adultos e imaturos

*Trichostrongylus*

*colubriformis* ..... adultos e imaturos

*Cooperia* spp ..... adultos e imaturos

*Cooperia*

*oncophora* ..... adultos

*Cooperia*

*punctata* ..... adultos

*Strongyloides*

*papillosus* ..... adultos

*Nematodirus* spp ..... imaturos

*Oesophagostomum*

*radiatum* ..... adultos e imaturos

*Oesophagostomum*

*venulosum* ..... adultos

*Trichuris* spp ..... adultos

## 2 - Nematódeo pulmonar:

*Dictyocaulus*

*viviparus* ..... adultos e imaturos

## **Parasitas externos:**

### 1 - Bernes - Larvas de

*Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis* e *H. lineatum*.

### 2 - Ácaros - *Chorioptes bovis*\*,

*Sarcoptes scabiei* - var. *bovis*.

### 3 - Piolhos - *Linognathus vituli*,

*Haematopinus eurysternus*,

*Solenopotes capillatus*,

*Damalinea bovis*.

### 4 - Carrapato - Ivermectina OF

auxilia também no controle do carrapato comum dos bovinos (*Boophilus microplus*).

\*auxilia no controle deste parasito quando usado como parte de um programa contínuo.

**Ivermectina OF** ajuda no controle da miíase cutânea (bicheiras), causada pelo estágio larval da mosca *Cochliomyia hominivorax*, quando administrado como preventivo.

## **Espectro de ação para ovinos:**

### 1 - Nematódeos gastrintestinais:

*Haemonchus*

*contortus* ... adultos e imaturos

*Ostertagia*

*circumcincta* ..... adultos e imaturos

*Ostertagia*

*trifurcata* ..... adultos

*Trichostrongylus*

*axeii* ..... adultos

*Trichostrongylus*

*colubriformis* ..... adultos e imaturos

*Trichostrongylus*

*vitrinus* ..... adultos e imaturos

*Nematodirus*

*filicollis* ..... adultos e imaturos

*Nematodirus*

*spathiger* ..... imaturos

*Cooperia curticei* ..... adultos e imaturos

*Oesophagostomum*

*columbianum* ..... adultos e imaturos

*Oesophagostomum*

*venulosum* ..... adultos

*Chabertia ovina* ..... adultos e imaturos

*Trichuris ovis* ..... adultos

*Strongyloides*

*papillosus* ..... imaturos

## 2 - Nematódeos pulmonares:

*Dictyocaulus*

*filaria* ..... adultos e imaturos

*Protostrongylus*

*rufescens* ..... adultos

## 3 - Bicho-da-cabeça:

*Oestrus ovis*

## 4 - Ácaros da sarna:

*Sarcoptes scabiei* (var. *ovis*)

*Psoroptes ovis*

*Psorergates ovis*

### **Espectro de ação para suínos:**

#### 1 - Nematódeos gastrintestinais:

*Ascaris suum* ..... adultos e imaturos

*Hyostrongylus*

*rubidus* ..... adultos e imaturos

*Oesophagostomum*

spp ..... adultos e imaturos

*Strongyloides*

*ransomi* ..... adultos

*Trichuris suis* ..... adultos

#### 2 - Nematódeos pulmonares:

*Metastrongylus*

spp ..... adultos

#### 3 - Nematódeo renal:

*Stephanurus*

*dentatus* ..... adultos e imaturos

#### 4 - Sarnas:

*Sarcoptes scabiei* (var. *suis*)

#### 5 - Piolhos:

*Haematopinus suis*

### **Restrições de uso:**

Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do

produto.

O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer, com a presença de irritação no local de aplicação e alterações de sistema nervoso central como balançar de cabeça, agitação transitória, salivação, lacrimejamento, edema cutâneo, eriçamento de pelo, tremores, alterações respiratórias, incoordenação motora e decúbito (achados similares aos previstos em literatura). Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático e de suporte conforme a sintomatologia clínica e a critério do médico-veterinário, podendo ser realizado com adrenalina (epinefrina) na dose de 0,02-0,03 mg/kg pela via intramuscular associado ou não a anti-inflamatório esteroidal (corticoide).

Aplicar somente pela via subcutânea.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semiconfinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e

animais domésticos.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS  
SEGUINTE PERÍODOS DE  
CARÊNCIA**

**BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE PRODUTO  
SOMENTE DEVE SER REALIZADO  
35 DIAS APÓS A ÚLTIMA  
APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE  
SER APLICADO EM FÊMEAS  
PRODUTORAS DE LEITE PARA O  
CONSUMO HUMANO.**

**OVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE PRODUTO  
SOMENTE DEVE SER REALIZADO  
28 DIAS APÓS A ÚLTIMA  
APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE  
SER APLICADO EM FÊMEAS  
PRODUTORAS DE LEITE PARA O  
CONSUMO HUMANO.**

**SUÍNOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE PRODUTO  
SOMENTE DEVE SER REALIZADO  
18 DIAS APÓS A ÚLTIMA  
APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM  
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS  
INDICADAS NESTA BULA PODE  
CAUSAR A PRESENÇA DE  
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES  
APROVADOS, TORNANDO O  
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL  
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Não jogar embalagens vazias  
em rios ou lagos. Produto tóxico  
para peixes.

**Venda sob prescrição e  
aplicação sob orientação do  
médico-veterinário.**

Obedecer às normas de  
aspepsia na administração deste  
produto.

Restos de produtos e de  
embalagens devem ser  
descartados conforme  
preconizado na legislação  
vigente.

Evitar fumar e se alimentar  
durante o manuseio do produto.

Lavar as mãos após o manuseio  
do produto.

Licenciado no Ministério da  
Agricultura sob nº 5.078 em  
24/04/95.

**Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508.

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Indústria brasileira



50022960 / 0716 OF00