

# Mastifin<sup>®</sup> Vaca Seca

Uso Veterinário

## Fórmula:

Cada seringa de 10 g contém:  
Sulfato de  
Gentamicina ..... 677,00 mg\*  
Excipiente q.s.p. .... 10,00 g  
\*Equivalente a 400,00 mg de  
Gentamicina base.

## Indicações:

Para o tratamento das mastites fora do período de lactação ("Vaca Seca").

**Mastifin Vaca Seca** possui uma formulação especial desenvolvida para o tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação, com uma ação prolongada, que se estende por 4 semanas. A ação bacteriana da Gentamicina atinge os principais agentes Gram-positivos e Gram-negativos causadores das mastites dos bovinos.

**Agentes:** *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Corynebacterium* spp, *Escherichia coli*, *Micrococcus* spp, *Pseudomonas* spp,

*Klebsiella* spp, *Serratia* spp, *Proteus* spp, *Enterobacter* spp.

## Modo uso e dosagem:

Após a última ordenha da lactação e a desinfecção dos tetos, aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g em cada quarto do úbere, em dose única. Recomenda-se fazer uma massagem de baixo para cima no úbere, para melhor dispersão do produto por toda a glândula mamária.

## Contraindicações:

Não aplicar em vacas com histórico de hipersensibilidade à Gentamicina.  
Não aplicar em vacas em lactação.  
Não aplicar em animais com problema de insuficiência renal.

## Interações medicamentosas:

A Gentamicina é inativada pela administração concomitante de carbenicilina.  
Não administrar Gentamicina concomitantemente com

relaxantes músculo-esqueléticos, pois aumenta a possibilidade de bloqueio neuromuscular. Não administrar Gentamicina concomitantemente com Furosemida ou Anfotericina B, pois aumenta a possibilidade de ototoxicidade e nefrotoxicidade.

### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**

#### **BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### **Reações adversas:**

Há possibilidade de reações alérgicas à Gentamicina, quando os animais são hipersensíveis.

Podem ocorrer ototoxicidade e nefrotoxicidade em tratamentos prolongados, porém, a reversão desses quadros geralmente ocorre após a suspensão do tratamento.

Uma reação mais rara é o bloqueio neuromuscular, que é revertido com a aplicação de gluconato de cálcio.

#### **Restrições de uso:**

**Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.**

Conservar em local seco e fresco, entre 5°C e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.663 em 11/01/99.

#### **Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina  
Pistoni CRMV/SP 24.508.

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofino.saudeanimal.com](http://www.ourofino.saudeanimal.com)  
Indústria brasileira



50003990 / 0718 OFEO