

# Estreptomax<sup>®</sup>

Uso Veterinário

## Fórmula:

### Cada frasco-ampola de pó contém:

Estreptomicina (Sulfato) ..... 5,00 g

### Cada ampola plástica contém:

Diluyente para injeção ..... 15,00 mL

## Indicações:

**Estreptomax<sup>®</sup>** é um antibiótico bactericida, indicado para bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos, com atividade principal contra bactérias Gram-negativas e atividade variável contra bactérias Gram-positivas.

### **Bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos:**

Leptospirose (*Leptospira* spp);  
Dermatofilose (*Dematophilus congolensis*);  
Actinobacilose ou língua de pau (*Actinobacillus lignieresii*);  
Gastroenterites e pneumoenterites em animais jovens (*Pasteurella* spp, *Staphylococcus* spp);  
Pneumonia e broncopneumonia (*Pasteurella* spp, *Salmonella* spp, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp);  
Artrites e poliartrites infecciosas (*Streptococcus* spp);  
Infecções cutâneas como abscessos e pododermatites (*Streptococcus* spp, *Staphylococcus* spp, *Salmonella* spp);  
Mastites (*Streptococcus* spp, *Staphylococcus* spp, *Salmonella* spp);  
Metrites e piometrites;  
Cervicites e vaginites (*Pasteurella* spp, *Streptococcus* spp, *Staphylococcus* spp);  
Sinusites (*Staphylococcus* spp);  
Nefrites e cistites (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Leptospira* spp);  
Vibriose (*Campylobacter fetus*).

## Modo de uso e dosagens:

O medicamento deve ser administrado somente pela via intramuscular, após a obtenção da diluição do pó com o diluyente que acompanha o produto.  
A dosagem recomendada é de 1,5 mL

para cada 50 kg de peso corporal, ou seja, 10 mg de Estreptomicina por kg de peso corporal, para todas as espécies a que se destina, com intervalos entre 8 e 12 horas, não devendo ultrapassar 7 dias de tratamento.

Peso do animal	Dose recomendada
5 kg	0,15 mL
10 kg	0,3 mL
25 kg	0,75 mL
50 kg	1,5 mL
100 kg	3,0 mL
200 kg	6,0 mL
400 kg	12,0 mL

Estas dosagens poderão ser modificadas a critério do médico-veterinário.

## Para leptospirose:

### **Bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos:**

Indica-se a dosagem de 1,5 mL para cada 20 kg de peso corporal, ou seja, 25 mg de Estreptomicina por kg de peso corporal, em dose única:

Peso do animal	Dose recomendada
10 kg	0,75 mL
50 kg	3,75 mL
100 kg	7,5 mL
200 kg	15 mL
400 kg	30 mL

## Para o tratamento da vibriose:

Proceder à lavagem e massagem do pênis e prepúcio durante aproximadamente 5 minutos com uma solução de Estreptomicina obtida através da diluição de 5 g de pó em 90 mL de um veículo oleoso, como vaselina líquida, uma vez ao dia durante três dias consecutivos. Os tratamentos preconizados podem ser modificados a critério do médico-veterinário.

## Contraindicações e limitações de uso:

Administrar somente pela via

intramuscular, observando-se as normas de assepsia.

Evitar a aplicação em fêmeas prenhes, no pré-parto, principalmente naquelas com histórico de eclâmpsia ou febre do leite.

Aplicar o produto com cautela em animais com insuficiência renal ou hepática, desidratados, muito debilitados ou em estado de choque.

Não aplicar o produto pela via intravenosa.

A ototoxicidade dos aminoglicosídeos é aumentada pelos diuréticos de ação na alça de Henle, especialmente a furosemida.

Altas concentrações de carbenicilina, ticarcilina e piperacilina inativam os aminoglicosídeos tanto *in vitro* como *in vivo* na presença de uma insuficiência renal.

#### Efeitos adversos:

Podem ocorrer otointoxicação, bloqueio neuromuscular ou nefrointoxicação dependendo da dose utilizada e da duração do tratamento. A superdosagem do produto pode causar náuseas, vômitos, salivação e ataxia.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, entre 5°C e 30°C, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

#### Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma - CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.395 em 13/11/2002.

#### Apresentação:

Frasco-ampola contendo 6,25 g de pó e ampola plástica contendo 15 mL de diluente.

#### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

##### BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

##### EQUÍDEOS (*Equus caballus*) CAVALOS) E SUÍNOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### Precauções:

Obedecer rigorosamente às indicações, preparação e dosagens para a aplicação do produto, bem como a duração do tratamento.

O produto diluído poderá ser utilizado por um prazo máximo de 7 dias, desde que armazenado sob refrigeração (2°C a 8°C).

#### Interações medicamentosas:

Não usar concomitantemente com anestésicos gerais ou relaxantes musculares, pois estes potencializam o efeito de bloqueio neuromuscular causado pelos aminoglicosídeos.



#### Proprietário:

**Oufino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.oufinosaudeanimal.com  
Indústria brasileira



#### Fabricante:

**Momenta Farmacêutica Ltda.**  
Rua Enéas Luis Carlos Barbanti, 216  
Freguesia do Ó - São Paulo - SP  
CNPJ: 14.806.008/0001-54