

Cortiflan

Uso Veterinário

Corticoide anti-inflamatório e antialérgico

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Fosfato Sódico de

Dexametasona 200,00 mg

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Tratamento dos processos inflamatórios em geral dos bovinos, equinos, suínos e ovinos, incluindo inflamações articulares e Cetose bovina. Auxiliar nos tratamentos de mastites, pneumonias graves, afecções reumáticas, alérgicas, dermatológicas e outros distúrbios onde for indicado o uso de corticoides.

Via de administração, modo de usar e dosagem:

Dose terapêutica: 0,25 mg a 20 mg de Dexametasona (Fosfato Sódico) por animal, sendo:

Bovinos: 2,5 mL a 10,0 mL/animal/via intramuscular ou intravenosa. Repetir a dose se necessário.

Equinos: 1,25 mL a 2,5 mL/animal/via intramuscular ou intravenosa. Repetir a dose se necessário.

Suínos e ovinos: 1,25 mL a 2,5 mL/

animal/via intramuscular ou intravenosa. Repetir a dose se necessário.

O intervalo entre as doses fica a critério do médico-veterinário.

Contraindicações:

Não administrar o produto em animais portadores de diabetes mellitus, insuficiência renal, osteoporose e verminoses graves. Não administrar em ruminantes no último trimestre da gestação, pois pode antecipar o parto.

Precauções:

Levar em conta que altas doses de Dexametasona podem causar depressão da função adrenocorticoide provocando atrofia da adrenal. A interrupção de um tratamento prolongado deve ser gradativa. Doses acima de 2,5 mL por animal (5 mg de Fosfato Sódico de Dexametasona) podem provocar sonolência ou letargia nos equinos. Doses excessivas podem causar convulsões.

O uso excessivo de corticoide em ovinos inibe o crescimento de lã. Nos quadros infecciosos, uma terapia

antibacteriana (quimioterápica ou antibiótica) deve ser iniciada junto com a administração do produto. Os animais sob tratamento devem ser monitorados, apesar do produto em doses baixas não provocar a retenção de sódio e de água nem a perda de potássio. O médico-veterinário deve estar alerta para perceber qualquer efeito inesperado e agir para corrigi-lo.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS E OVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

EQUÍDEOS (*Equus caballus*/CAVALOS) E SUÍNOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Prazo de validade: 02 anos após a data de fabricação.

Apresentação:

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 10 mL e 50 mL.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 8328/02 em 06/09/2002.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817



Proprietário e fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira

