

Brinco Mosquicida Na MOSCA[®]

Uso Veterinário

**Proteção duradoura e eficaz na eliminação da mosca-dos-chifres.
Quebra a barreira da resistência.**

Fórmula:

Cada brinco de 15 g contém:

Diazinon 6,0 g

Veículo q.s.p. 15,0 g

Indicações:

Brinco Mosquicida Na MOSCA[®] é um brinco para fixação na orelha de bovinos, que permite uma liberação lenta do Diazinon, parasiticida extremamente ativo, indicado no controle e eliminação de infestações pela mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*).

Modo de uso e dosagens:

Produto de uso externo, exclusivo para fixação na orelha dos animais. Os brincos devem ser aplicados em uma das orelhas dos animais, com o auxílio de um aplicador, de maneira que sua fixação ocorra entre a segunda e a terceira cartilagem da orelha, conforme apresentado ao lado.

Intervalo entre a troca de brincos:

A frequência com que os brincos deverão ser trocados dependerá da infestação e do manejo integral da praga baseado no limiar de infestação e na dinâmica populacional. Em média, os brincos deverão ser trocados após quatro meses decorridos da sua fixação, pois a partir deste período a queda da concentração de ativo nos brincos pode ocasionar resistência por parte dos parasitos.

Contraindicações e limitações de uso:

Não utilizar em animais com menos de 3 meses de idade, pois sua fixação pode acarretar algum dano às orelhas destes animais.

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida ao composto do produto.

Precauções:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Os brincos devem ser armazenados nas embalagens originais, em ambientes frescos, evitando-se a incidência de raios solares diretos.

Utilizar todos os brincos imediatamente após a abertura da embalagem.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.

O contato com a pele, olhos e a boca deve ser evitado.

Evitar contato com a pele ou com os olhos utilizando luvas descartáveis para a aplicação dos brincos.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Se ocorrer contato com os olhos, lavá-los abundantemente com água morna e procurar atendimento médico se a irritação persistir.

Se ocorrer ingestão acidental procurar imediatamente atendimento médico.

Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

Produto tóxico para peixes e aves.

Descartar as embalagens vazias e restos de produto, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

Os brincos deverão ser retirados antes do abate dos animais.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto dentro da posologia recomendada, entretanto reações de

sensibilidade individuais podem eventualmente ocorrer. Em caso de má administração de doses ou intoxicações acidentais poderão ocorrer efeitos adversos como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispneia, fasciculação, ataxia e convulsões.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06 HORAS APÓS A RETIRADA DO BRINCO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 01 DIA APÓS A RETIRADA DO BRINCO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interações Medicamentosas:

O uso concomitante com outros organofosforados e carbamatos pode potencializar a toxicidade colinérgica do Diazinon.

A toxicidade dos organofosforados também pode ser alterada na presença de drogas que possuem propriedades bloqueadoras neuromusculares, tais como anestésicos voláteis, íon de magnésio, outros agentes bloqueadores neuromusculares e drogas que competem com os organofosforados por esterases-alvo (succinilcolina, fenotiazina e procaína).

Outros compostos podem interferir com a toxicidade do Diazinon indiretamente, tais como hipnóticos e sedativos (barbitúrticos); anti-inflamatórios (fenilbutazona); analgésicos (aspirina, morfina), anti-histamínicos (difenidramina), inseticidas (DDT, BHC, aldrin, dieldrin, piretrinas) e hormônios esteroides (testosterona, progesterona, cortisona).

Informações para uso médico:

O Diazinon é um organofosforado, inibidor da colinesterase, podendo-se utilizar o sulfato de atropina como antídoto. Nas toxicoses por agentes anticolinesterásicos é contraindicado o uso concomitante de succinilcolina, tranquilizantes fenotiazínicos e outros medicamentos causadores de depressão respiratória, além de procaína, compostos com magnésio, anestésicos inalatórios, agentes bloqueadores neuromusculares, antibióticos aminoglicosídeos, clindamicina, lincomicina, polimixinas A e B, colistina e teofilina.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.022 em 17/01/2005.

Responsável Técnica:

Dra. Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Apresentação:

Sachês laminados com 10 ou 20 brincos de 15 gramas cada, acondicionados ou não em cartuchos.



Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira




Colocação Brinco Mosquicida Na MOSCA®

Modo de usar:


1. Desinfetar o aplicador antes do uso.
2. Uso externo, o brinco deve ser colocado na parte externa da orelha, em sua porção mediana, de maneira que sua fixação ocorra entre a segunda e a terceira cartilagem, com auxílio de um aplicador, conforme o diagrama abaixo indicado:

1




Introduza o macho no pino do aplicador e empurre para cima até o encaixe completo.

2



Coloque a fêmea (brinco) pressionando a alavanca, de maneira que o anel de segurança esteja direcionado para fora do aplicador, alinhando a ponta do macho com a perfuração do brinco (fêmea).



3



Posicionar o aplicador no centro da orelha do animal.
Aplicar o brinco entre a segunda e a terceira cartilagem.

4



Posição correta para a permanência do brinco no animal.