

Sincro eCG[®]

Uso Veterinário

Gonadotrofina coriônica equina injetável (eCG)

Fórmula:

Frasco:

eCG (PMSG)

Liofilizado 6.000 UI

Excipiente 0,052 g

Frasco com diluente (Água para injeção) 30,00 mL

Indicações:

Sincro eCG é recomendado para a estimulação do crescimento folicular levando assim a uma maior capacidade ovulatória das fêmeas bovinas em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e transferência de embrião em tempo fixo (TETF). Pode ainda ser utilizado para superovulação de fêmeas bovinas.

Modo de uso e dosagens:

Diluição do produto:

Frasco com 6.000 UI de eCG e frasco com 30 mL de diluente estéril:

Adicionar 5 mL do diluente estéril no frasco contendo o liofilizado de 6.000 UI de eCG, homogeneizar e devolver o volume com o liofilizado ao frasco de diluente.

Usos:

- Estimulante de desenvolvimento folicular (protocolos de IATF):

Administrar uma dose de 300 UI, ou seja, 1,5 mL de **Sincro eCG** por via intramuscular profunda, por animal.

- Indutor de múltiplas

ovulações (protocolos de TETF em receptoras):

Administrar uma dose de 500 UI, ou seja, 2,5 mL de **Sincro eCG** por via intramuscular profunda, por animal, no dia 5 do protocolo.

- Protocolo proposto para uso do **Sincro eCG**:

Administrar em dia aleatório do ciclo estral (Dia 0)

Benzoato de Estradiol associado a dispositivo

intravaginal de

Progesterona. Cinco dias

depois (D5) fazer a

aplicação do **Sincro eCG** de acordo com o objetivo

proposto (estimulante de

desenvolvimento folicular ou superovulação) garantindo

seu efeito sobre o

crescimento folicular. No Dia

8 (D8) fazer a remoção do dispositivo intravaginal de

Progesterona e administrar um análogo da

prostaglandina

(Cloprostenol Sódico). A

indução da ovulação pode

ser feita com o uso do Cipionato de Estradiol no momento da retirada do dispositivo ou com o Benzoato de Estradiol 24 horas após a retirada dos dispositivos. A inseminação deve ser feita após 48 a 72 horas da retirada do dispositivo, e a TETF deve ser realizada após 9 dias da retirada dos dispositivos, conforme diagramas abaixo:

Protocolo de IATF



Protocolo de TETF



Uma vez que a resposta aos tratamentos hormonais é individualizada os protocolos e dosagens utilizadas podem ser alteradas a critério do

médico-veterinário.

Contraindicações e limitação de uso:

O uso de **Sincro eCG** é contraindicado para animais com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Doses elevadas produzem superovulação não sendo aconselhável para animais a serem inseminados ou cobertos (monta natural) em virtude da possibilidade de gestações múltiplas, exceto para fins de transferência de embriões. Não utilizar o produto em animais que não estejam em idade reprodutiva. O sucesso da utilização de **Sincro eCG** é dependente de protocolos hormonais reprodutivos adequados e de fatores adequados no manejo do rebanho que reduzem o anestro e aumentam as taxas de prenhez como nutrição e

sanidade.

Precauções:

Uso exclusivo em fêmeas bovinas. Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia adotando devidos cuidados na manipulação.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Não utilizar o produto fora do prazo de validade.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas quando o produto é utilizado dentro das recomendações indicadas. Reações de hipersensibilidade e anafilaxia podem ocorrer em animais susceptíveis.

Venda sob prescrição e

**aplicação sob orientação
do médico-veterinário.**

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA:**

BOVINOS:

**O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA
PARA O ABATE DOS
BOVINOS TRATADOS.**

**O PRODUTO NÃO REQUER
PERÍODO DE CARÊNCIA
PARA O CONSUMO DO LEITE
DOS BOVINOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
EM CONDIÇÕES DIFERENTES
DAS INDICADAS NESTA
BULA PODE CAUSAR A
PRESENÇA DE RESÍDUOS
ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM
ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O
CONSUMO.**

Conservar sob refrigeração,
em temperatura entre 2°C e
8°C, ao abrigo da luz solar
intensa e fora do alcance

de crianças e animais
domésticos. Após
reconstituição o produto
poderá ser mantido por até
7 dias sob refrigeração em
temperatura de 2°C a 8°C.

Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 9.631 em
07/10/2011.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508

PRODUTO IMPORTADO

Representante exclusivo no Brasil,
Importador e Distribuidor:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinaudeanimal.com
Indústria brasileira



Proprietário e Fabricante:
Laboratório Biomega S.A.
Camino Paso Tabora s/n
Melo - Cerro Largo
Uruguai

 **ourofino**
saúde animal