

# Finador<sup>®</sup>

— Uso Veterinário

## Analgésico, antipirético e espasmolítico

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Dipirona Sódica ..... 50,00 g

Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

### Informações Técnicas:

O princípio ativo do **Finador**, a Dipirona, é um derivado da pirazolona, com elevada ação analgésica, determinada pela supressão, em nível central da percepção da dor.

Além de analgésico o **Finador** tem ação antipirética (antitérmica), reduzindo a temperatura corporal nos casos em que esta estiver acima do normal, ou seja, só atua quando realmente houver febre. A ação antiprostaglandínica da Dipirona se traduz, também, numa atividade anti-inflamatória, que somada às ações anteriores fazem do **Finador** uma excelente arma no combate à dor, febre e espasmos da musculatura lisa.

As ações do **Finador** são observadas após 15 a 20 minutos, permanecendo seu efeito por algumas horas.

Se necessário, repetir a dosagem após mais ou menos 4 horas da primeira aplicação.

**Finador** pode ser aplicado inclusive em fêmeas gestantes.

### Indicações:

**Finador** é indicado para bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos em todos os estados em que estes animais manifestam dor ou febre de

origem variada: cólicas, feridas, infecções virais e bacterianas, dores musculares, lumbago dos cavalos, inflamações, obstruções ou corpos estranhos, principalmente no esôfago e estados reumáticos, envolvendo articulações. Como indicação complementar, recomenda-se o **Finador** para suprimir a intranquilidade e temor decorrentes de dor intensa, permitindo e facilitando exames, tratamentos e manejo dos animais e como coadjuvante na prevenção e tratamento da síndrome MMA.

### Doses e modo de usar:

**Finador** deve ser aplicado por via intramuscular ou intravenosa lenta, nas seguintes doses:

Bovinos e equinos

adultos ..... 20 a 35 mL

Bezerros e potros ..... 5 a 15 mL

Suínos adultos ..... 15 a 20 mL

Suínos jovens, ovinos e

caprinos ..... 5 a 15 mL

Repetir a dosagem se necessário após 4 a 6 horas.

Alterações da posologia podem ser efetuadas na dependência da gravidade do caso, ou a critério do médico-veterinário.

### Precauções:

Obedecer às dosagens indicadas para o uso do produto.

A condição hematológica do animal deve ser controlada, quando são necessários tratamentos prolongados.

Aplicação subcutânea de grande volume (acima de 10 mL num só lugar) pode provocar leve edema que se resolve após alguns dias.

#### Efeitos adversos:

A Dipirona tem uma tendência para aumentar a hemorragia.

Em tratamentos prolongados, a Dipirona pode induzir agranulocitose e leucopenia.

A superdosagem pode resultar em convulsões.

#### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

##### BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

##### EQUÍDEOS (*Equus caballus/CAVALOS*) E SUÍNOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### Interações medicamentosas:

- Utilizar com bastante precaução o **Finador** em associação com clorpromazina pois pode ocorrer

séria hipotermia.

- Não utilizar concomitantemente a Dipirona com outros anti-inflamatórios como Fenilbutazona e ácido acetil salicílico, pois poderá ocorrer somatória das ações tóxicas ou farmacológicas.

- Não utilizar concomitantemente a Dipirona com barbitúricos.

#### Contraindicações e limitações de uso:

- O produto não deve ser administrado a animais que apresentem hipersensibilidade à Dipirona.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.659 em 07/01/1999.

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofino.saudeanimal.com](http://www.ourofino.saudeanimal.com)  
Indústria brasileira



50003322/0918 CF00