

Fluatac DUO[®]

Uso Veterinário

Controle estratégico de carrapatos, bernes, mosca-dos-chifres e nematódeos gastrintestinais.

Endectocida pour on para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Fluazuron 3,00 g
Abamectina 0,50 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações principais:

Fluatac DUO é indicado para o controle estratégico de carrapatos *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, de mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e para o controle de bernes (larvas de *Dermatobia hominis*). Também é indicado para o tratamento de bovinos infectados por nematódeos gastrintestinais (*Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichostrongylus axei* e *Trichuris discolor*).

Dosagens:

Fluatac DUO deve ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação na linha dorsal dos bovinos (fio do lombo), na dose de 1 mL para cada 10 kg, conforme tabela abaixo. Produto para aplicação em dose única.

Peso (kg)	Volume de Fluatac DUO (mL)
51-100	10
101-150	15
151-200	20
201-250	25
251-300	30
301-350	35
351-400	40
401-450	45
451-500	50
501-550	55
551-600	60
601-650	65
Acima de 650	1 mL/10 kg

Possíveis efeitos colaterais:

O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer.

Restrições de uso:

Não aplicar em bezerras com idade inferior a 16 semanas.

PRODUTO INDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA BOVINOS DE CORTE. NÃO UTILIZAR EM VACAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

Não é conhecida nenhuma interação medicamentosa com os princípios ativos.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 60
DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS
DE LEITE PARA O CONSUMO
HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS
ACIMA DOS LIMITES APROVADOS,
TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM
ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O
CONSUMO.**

**Intoxicação e superdosagem
nos animais:**

No caso de intoxicação por alta dosagem, os animais podem apresentar depressão motora geral, aumento da taxa respiratória, tremores musculares, midríase e rigidez extensa. Não há antídoto. O tratamento deve ser sintomático.

Precauções:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.
Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.
Não utilizar produto com prazo de validade vencido.
Após aberta a embalagem, utilizar o produto em até 4 meses.
Recomenda-se o uso de luvas de borracha para o manuseio e aplicação do produto.
Não fumar e não manipular alimentos durante a aplicação do

produto.
Evitar contato direto com a pele e retirar com água qualquer derramamento accidental.
Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente.
A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semiconfinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9557 em 18/03/2010.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

CUIDADO  VENENO

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNP J: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



 **ourofino**
saúde animal