

Superhion[®]

Uso Veterinário

Ectoparasiticida à base de Fipronil e Fluazuron para bovinos.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Fipronil 1,00 g

Fluazuron 3,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações principais:

Superhion é um ectoparasiticida pour on para bovinos, composto pela associação entre Fipronil e Fluazuron, indicado no controle estratégico de carrapatos e mosca-dos-chifres, e para o tratamento contra bernes e miíases. Tratamento em dose única.

Parasitas para os quais o uso de **Superhion** é indicado:

Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Moscas: Mosca-dos-chifres *Haematobia irritans*.

Bernes: Larvas de *Dermatobia hominis*.

Miíases: Larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

Modo de uso e dosagens:

Superhion deve ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, do meio do pescoço até a inserção da cauda, na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal.

Dosagem equivalente a 1 mg de Fipronil e a 3 mg de Fluazuron por kg de peso corporal.

O produto não deverá ser administrado em períodos com previsão de chuvas.

Contraindicações e limitações de uso:

Não aplicar em bezerros com idade inferior a 02 meses.

Não utilizar o produto em condições diferentes às indicadas em bula.

O produto não deve ser utilizado em animais que apresentem hipersensibilidade ao Fipronil ou ao Fluazuron.

Nos estudos clínicos realizados com o **Superhion**, o produto se mostrou seguro para o tratamento antiparasitário de bovinos com idade acima de 02 meses.

Precauções:

Não administrar em animais com a pele lesionada.

Não deixar o produto em contato com rações animais ou alimentos armazenados.

Ao manipular o produto, utilizar equipamentos de proteção individual (macacão, máscara e luvas).

Evitar longo contato com a pele e a inalação do produto. As mãos deverão ser lavadas após o manuseio do produto.

Se acontecer contato acidental com os olhos e a pele, lavar com água abundante. Em caso de ingestão acidental não induzir o vômito e consultar o médico.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente.

Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
54 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE
SER APLICADO EM FÊMEAS
PRODUTORAS DE LEITE PARA O
CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Reações Adversas:

O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas.

Reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.113 em 31/07/2015.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

CUIDADO  VENENO

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



 **ourofino**
saúde animal