

Ractosuin[®] 10%

Aditivo melhorador de desempenho.

Composição Básica do Produto:

Ácido Benzoico, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Cloridrato de Ractopamina, Óleo de Soja Refinado, Casca de Arroz 85,972%.

Eventuais Substitutivos:

Não há Substitutivos

Níveis de Garantia do Produto:

Garantias	Valor	Unidade
Cloridrato de Ractopamina (Mínimo) ..	100,0000	g/kg

Indicação de Uso:

É indicado para uso exclusivo em suínos em fase de terminação, para o aumento da massa muscular e para a redução da deposição de gordura na carne. Melhora a conversão alimentar e o rendimento da carcaça, aumentando a quantidade de carne magra.

Modo de Usar:

O produto deverá ser misturado à ração dos suínos em terminação na proporção de 50 a 200 gramas do **Ractosuin 10%** por tonelada de ração, correspondente a 5 e 20 ppm de Ractopamina, respectivamente. Para garantir uma distribuição homogênea do **Ractosuin 10%** na

ração final, é recomendável fazer-se uma pré-mistura com milho moído ou farelo de soja e posteriormente misturar na ração. É recomendável também que não se misture o produto ao mesmo tempo com o óleo vegetal quando este for adicionado à ração. A ração deverá ser a única fonte de alimento dos suínos para esta fase de criação.

Período de Retirada:

O produto não requer período de carência anteriormente ao abate dos animais.

Restrições:

Este produto não deve ser utilizado nas fases de cria e recria.

Modo de Conservar:

Ractosuin 10% deve ser mantido em sua embalagem original, bem fechado e acondicionado em local fresco, seco e longe de produtos tóxicos, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Medidas de Precaução:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças. Ao manusear o produto, utilizar os equipamentos de proteção

individual (roupa protetora, luvas impermeáveis, óculos protetores para os olhos e máscara contra pó). Após manipulação do produto, os operadores devem se lavar completamente com água e sabão. Em caso de contato acidental com os olhos ou com a pele, lavar imediatamente com água em abundância. No caso de inalação ou ingestão procurar auxílio médico. **Atenção:** **Ractosuín 10%** não se destina para uso em seres humanos. O Cloridrato de Ractopamina, ingrediente ativo do **Ractosuín 10%**, é um agonista beta-adrenérgico, portanto, pessoas com doenças cardiovasculares devem tomar precauções especiais para evitar exposição ao produto.

**VENDA PROIBIDA EM CASAS
COMERCIAIS E
ESTABELECIMENTOS DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.**

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Produto Registrado no Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento sob o
nº SP-00768 30050.

Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



 **ourofino**
saúde animal

