

# COLOSSO FC30

Uso Veterinário

Fenthion, Cipermetrina e Clorpirifós  
Carrapaticida, Mosquicida e Bernicida para  
Pulverização em Bovinos

## Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Clorpirifós .....	30,0 g
Cipermetrina .....	15,0 g
Fenthion .....	15,0 g
Veículo q.s.p. ....	100,0 mL

## Indicações principais:

**COLOSSO FC30** auxilia no controle de carrapatos *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e bernes (larvas de *Dermatobia hominis*) em bovinos. Pode ser usado em pulverização ou em banho de imersão.

## Dosagens e modo de usar:

Diluir 25 mL de **COLOSSO FC30** em 20 litros de água limpa (1 L de **COLOSSO FC30** para 800 L de água) e agitar bem até a completa homogeneização da calda (produto + água), utilizando conforme o modo de aplicação escolhido:

### Pulverização

Realizar uma pré-mistura do produto com água limpa em um recipiente, agitando até a completa homogeneização, depois completar com água, conforme dosagem indicada em bula.

Com a calda, pulverizar toda a superfície do animal incluindo

orelhas, barbela, axilas, virilhas, o início da cauda e toda parte inferior do animal, deixando-o completamente molhado e garantindo assim um banho completo e que todas as partes do corpo recebam o produto.

3 a 5 litros de calda geralmente são suficientes para molhar todo o animal, o que corresponde a aproximadamente 3,7 a 6,2 mL de **COLOSSO FC30**/animal.

A aplicação de **COLOSSO FC30** deve ser feita individualmente, com o animal contido. O equipamento para aplicação por pulverização deve possibilitar um banho com pressão forte o suficiente para que o produto atinja o couro do animal. O bico utilizado no equipamento deve possibilitar que a calda saia na forma de leque, a aplicação de baixo para cima no sentido contrário ao dos pelos e sempre a favor do vento, para a proteção do aplicador.

Após o banho, o animal deve ficar completamente molhado, para que o produto atinja até mesmo os carrapatos pequenos e em partes do corpo onde não são vistos com facilidade.

Após a diluição, a calda contendo **COLOSSO FC30** para pulverização deverá ser utilizada em até 24 horas.

## Banho de imersão

Realizar uma pré-diluição do produto em água limpa. Adicionar esta primeira solução obtida à água do tanque ou banheiro de imersão de modo a obter uma solução final de acordo com as diluições indicadas em bula.

Homogeneizar bem.

Não adicionar nenhum tipo de estabilizante. Os animais devem passar pelo banheiro de maneira individual, de modo que todo o corpo fique em pleno contato com a calda. Sempre que a solução permanecer parada homogeneizar novamente. As recargas deverão ocorrer mediante análise da calda. O tanque ou banheiro de imersão deve estar limpo e livre de resíduos.

Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

### Contraindicações:

Não utilizar em bezerros com menos de 3 meses de idade.

Não utilizar em animais estressados, doentes ou convalescentes, cansados,

sedentos ou debilitados.

Não administrar em pele lesionada.

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

### Precauções em animais:

Evitar aplicar o produto em horas de calor intenso ou em dias chuvosos, pois essas condições não foram avaliadas.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Não foram realizados estudos de segurança com animais prenhes.

### Precauções em humanos:

**Cuidado!** Irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

**Perigo!** Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Em caso de inalação ou aspiração acidental, procure um local arejado, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto. Durante a utilização do produto,

proteger-se com roupas, luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequados. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não utilizar equipamento com vazamento. Não desentupir bicos, orifícios e válvulas com a boca.

Não aplicar o produto contra o vento.

Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas,

medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.

Limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme

preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Produto tóxico para peixes. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

#### **Interações medicamentosas:**

Não misturar a outros produtos.

Inibidores da oxidase de função

mista, como o butóxido de piperonila e N-octil-bicicloheptano dicarboxilamida suprimem a hidrólise de piretrinas e piretróides, potencializando sua atividade.

Fármacos que possuem propriedades bloqueadoras neuromusculares, tais como anestésicos voláteis, íon de magnésio e agentes bloqueadores neuromusculares e fármacos que competem com os organofosforados por esterases-alvo, como a succinilcolina, fenotiazina e procaina podem aumentar a toxicidade dos organofosforados.

#### **Reações Adversas:**

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula.

Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos, porém em caso de intoxicações são observadas reações como salivação e vômito, hiperexcitabilidade, tremores, incoordenação motora (ataxia) e convulsões, dispneia, fraqueza e prostração.

A intoxicação por anticolinesterásicos como os organofosforados compreende uma série de sinais característicos como sialorréia, vômito, sudorese, cólicas abdominais, diarreia, bradicardia, broncoconstrição, incontinência urinária, tremores, fraqueza muscular, prostração e convulsões.

No caso de intoxicação por superexposição dérmica, a pele deve ser lavada com água e sabão em abundância. Nos casos de ingestão, recomenda-se lavagem gástrica até duas horas após a exposição e administração de carvão ativado.

Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**

#### **BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### **Informações para uso médico:**

**Grupo químico:** Piretroide sintético/ Composto

organofosforado;

**Ingrediente ativo:** Cipermetrina/ Clorpirifós/ Fenthion;

**Ação Tóxica:** Hipersensibilizante, irritante das mucosas/ Inibição da enzima colinesterase;

**Antídoto/Tratamento:**

Anti-histamínicos e efetuar tratamento sintomático/ Sulfato de atropina e reativadores de colinesterase.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, consumir o produto em até 06 meses, mantendo-o em condições adequadas de armazenamento, conforme orientação de bula.

**Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.736 em 01/08/2013.

**Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508.

CUIDADO  VENENO

KIT 50004409/36

**Proprietário e fabricante:**  
Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Indústria brasileira



Atendimento  
16 3518 2025



Whats SAC  
16 98181 8687  
(seg. a sex. das 8h às 17h)



PAPEL

50004390 / 0820 OF60

 **ourofino**  
saúde animal