

Maxicam 2%

Uso Veterinário

Anti-inflamatório não-esteróide. Ação anti-inflamatória mais potente e duradoura, sem complicações gástricas.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Meloxicam 2,0 g
Excipiente q.s.p. 100,0 mL

Indicações:

Maxicam 2% é um anti-inflamatório não esteróide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (cox-2), que confere um duplo benefício terapêutico, resultando em excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos de inflamação degenerativa do aparelho locomotor.

Maxicam 2% é indicado em processos

inflamatórios dos bovinos, suínos e equinos; tais como:

- Patologias do aparelho locomotor e doenças músculo-esqueléticas, como: miosites, tendinites, osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, osteoartrrose, sinovites, distensões miotendinosas, traumatismos, claudicações, síndrome do navicular, laminites e auxiliar na reparação de fraturas.
- Afecções oculares: uveítes, conjuntivites, pós-operatório.
- Desordens de ordem reprodutiva como retenção de placenta.
- Metrites e mastites.
- Analgesia pré e pós-operatória.
- Auxiliar no tratamento de infecções bacterianas ou crônicas (pneumonias e diarreias) e quadros febris.

Modo de uso e dosagens:

Maxicam 2% deve ser administrado pela via intramuscular ou intravenosa, uma vez ao dia (a cada 24 horas), ou de acordo com a orientação do médico-veterinário.

Dosagem para bovinos	2,5 mL para cada 100 kg de peso corporal (0,5 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Dosagem para suínos	2,0 mL para cada 100 kg de peso corporal (0,4 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Dosagem para equinos	3,0 mL para cada 100 kg de peso corporal (0,6 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

Duração do tratamento:

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a espécie animal, gravidade do quadro e tipo de afecção a ser tratada.

Recomenda-se até duas aplicações consecutivas, com intervalo de 24 horas, ou a critério do médico-veterinário.

Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteróides ou não esteróides, ou após o uso destas drogas. Recomenda-se um período de 24 horas de intervalo entre um tratamento e outro, ou de acordo com a farmacocinética da droga anteriormente utilizada.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos (Estreptomicina, Neomicina, Gentamicina e Kanamicina).

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina e a aspirina.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos em razão do risco de toxicidade renal ser potencializado.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 08 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

EQUÍDEOS (*Equus caballus*/ CAVALOS) E

SUÍNOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 08 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto utilizando normas de assepsia próprias para aplicação parenteral.

O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Reações adversas:

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Informações para uso médico:

O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da família dos oxicans e não possui antídoto específico.

No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.193 em 05/01/06.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



50003325/0918 OF00