

Lepecid[®] BR spray

Uso Veterinário

Mata Bicheira

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Clorpirifós 5,00 g
Veículo q.s.p. ... 100,0 mL

Gás Propelente:

Butano/Propano 163 g por lata

Indicações principais:

Lepecid BR spray é indicado no combate às miíases cutâneas (bicheiras) de bovinos.

Dosagens e modo de uso:

Aplicar o produto em toda a área afetada, bem como ao seu redor, mantendo o tubo de "spray" a uma distância de 10 - 20 cm da região a ser tratada.

Restrições de uso:

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto.

Interações medicamentosas:

A presença de outros compostos químicos pode alterar a toxicidade dos organofosforados. Dentre estes compostos podemos citar drogas que possuem propriedades bloqueadoras neuromusculares, tais como anestésicos voláteis, íon de

magnésio, outros agentes bloqueadores neuromusculares e drogas que competem com os organofosforados por esterases-alvo (succinilcolina, fenotiazina e procaina).

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto dentro da posologia recomendada. A intoxicação por anticolinesterásicos como os

organofosforados compreende uma série de sinais característicos como sialorreia, vômito, sudorese, cólicas abdominais, diarreia, bradicardia, bronco-constricção, incontinência urinária, tremores, fraqueza muscular, prostração e convulsões.

Precauções:

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Durante a administração evite que o produto atinja os olhos e boca do animal.

Recomenda-se um período mínimo de duas horas entre o tratamento e a exposição à chuva.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Não comer ou beber durante o manuseio do produto.

O contato com a pele, olhos e a boca deve ser evitado.

Não desentupir válvulas com a boca.

Não fumar durante a aplicação do produto; não utilizar próximo ao fogo, pois o gás é inflamável.

Não reutilizar ou perfurar as embalagens vazias.

Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Não aplicar o produto contra o vento.

Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Informações para uso médico:

Organofosforados: antídoto -

sulfato de atropina e reativadores da colinesterase.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.825 em 10/07/2014.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

*** Indicação quantitativa atendendo a Portaria nº 75, de 19 de maio de 1999 do INMETRO**

CUIDADO  **VENENO**

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



Fabricante:
Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares km 113, Caixa 611
Bairro Barreiro, Araçoiaba da Serra-SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52

 **ourofino**
saúde animal