

Performa EP

Uso Veterinário

Endectocida à base de Eprinomectina para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Eprinomectina 1,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações principais:

A Eprinomectina é um derivado semissintético das avermectinas, que são um grupo de lactonas macrocíclicas quimicamente relacionadas, produzidas por meio da fermentação de um fungo habitante do solo, o *Streptomyces avermitilis*.

Performa EP é um endectocida de amplo espectro para bovinos, indicado para o combate e controle de nematódeos gastrintestinais, bernes, carrapatos e moscas. Tratamento em dose única.

Parasitas para os quais o uso de

Performa EP é indicado:

Nematódeos gastrintestinais:

Haemonchus placei, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Trichostrongylus axei* e *Oesophagostomum radiatum*.

Parasitas Externos:

Bernes: Larvas de *Dermatobia hominis*.
Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Moscas: Mosca-dos-chifres
Haematobia irritans.

Modo de uso e dosagens:

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme o quadro abaixo:

Peso (kg)	Dose (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL
1 mL a cada 50 kg	

Dosagem equivalente a 200 µg de Eprinomectina por kg de peso corporal.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar o produto por via intravenosa ou intramuscular.

Nos estudos realizados com o **Performa EP**, o produto se mostrou seguro para o tratamento antiparasitário de bovinos com idade acima de 02 meses de vida.

Precauções:

Obedecer às dosagens recomendadas

para uso do produto.

Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente.

Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 08 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Reações Adversas:

O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer, com a presença de irritação no local de aplicação e alterações de sistema nervoso central como balançar de cabeça, agitação transitória, salivação, lacrimejamento, edema cutâneo, eriçamento de pelo,

tremores, alterações respiratórias, incoordenação motora e decúbito (achados similares aos previstos em literatura). Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático e de suporte conforme a sintomatologia clínica e a critério do médico-veterinário, podendo ser realizado com adrenalina (epinefrina) na dose de 0,02-0,03 mg/kg pela via intramuscular associado ou não a anti-inflamatório esteroidal (corticoide).

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.001 em 06/03/2015.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



50003362 / 0419 / CP-00

ourofino
saúde animal